

2022年度 JA山形おきたま さくらんぼ 病 害 虫 防 除 基 準 ①

桜桃振興部会

月日	散布時期	対象病害虫	薬剤名及び濃度(水100%当り薬量)	収穫前使用日	総使用回数	散布量(10a)	注意事項
① /	休眠期	-	水 (88%)	※水88%にハーベストオイル2%+石灰硫黄合剤10%を希釈する。(合計100%)		400%	○ハーベストオイルの希釈液に石灰硫黄合剤を10倍になるよう混用する。 ○カイガラムシ類の発生が多い場合は、ハーベストオイル50倍を希釈後にアプロードフロアブル1,000倍(7日前/2回以内)を混用し散布する(石灰硫黄合剤は入れない)。 ○休眠期の石灰硫黄合剤散布は樹脂細菌病にも効果がある。 ○耐寒性(凍霜害)強化を期待し、霜・低温の恐れがある場合はアイスバリア333倍を散布する。(散布液がしっかり乾く必要があるため、夕方散布は控える) 【耕種的防除(病害対策)】 ○剪定の切り口には、トップジンMペーストまたはバツレト(3回以内)を原液で塗布する。 ○樹脂細菌病対策として、風当たりが強い園地では、防風ネットを設置する。また、樹脂の漏出が見られたら、褐変部位を大きめに削り取り、癒合剤を塗布する。 ○灰星病対策として、枯死枝やミ行果は、見つけしだい摘除し、適切に処分する。
		カイガラムシ類	ハーベストオイル 50倍(2%)	発芽前	-		
		越冬病害虫 ハダニ類 カイガラムシ類	石灰硫黄合剤 10倍(10%)	発芽前	-		
② /	佐藤錦の 開花直前 (風船状の頃)	灰 星 病 幼 果 菌 核 病 炭 褐 色 せん 孔 病	トレンックスフロアブル 500倍(200cc)	21日前	5回以内 (但し、萌芽後は 2回以内)	500%	○トレンックスフロアブルに替えて、ICボルドー66D 40倍(—/—)を散布してもよい。 ○降雨が多く、低温が続く場合は、スミックス水和剤1,500倍(14日前/3回以内)を2~3分咲き時に追加散布する。
訪花昆虫を保護するため、開花1週間前から巣箱を撤去するまで殺虫・殺ダニ剤の散布をしない。 マコバチの増殖は5月中旬まで活発に行われるので、殺虫殺ダニ剤を控える。							
③ /	8分咲き (満開期)	灰 星 病 炭 褐 色 せん 孔 病 黒 斑 病 幼 果 菌 核 病	ナリアWDG 2,000倍(50g)	前日	3回以内	500%	○訪花昆虫を保護するため、活動時間前(早朝)に散布を行う。 ○灰星病、幼果菌核病防除の重要な時期なので、遅れず散布する。
		ハ マ キ ム シ 類 ケ ム シ 類	バイオマックスDF 2,000倍(50g)	発生初期 但し、 前日まで	-		
④ /	落花始め (花びらが褐変 し始めたころ)	展 着 剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	-	-	500%	○パスワード顆粒水和剤は、スチューベン、ヒムロト、バツファローの新葉に波打症状の薬害がでることがあるので、飛散しないように注意する。 ○コアオカシカメによる葉や果実の吸汁被害が多い園は、訪花昆虫が活動していない早朝や夕方にウラウDF 2,000倍(前日/2回以内)を加用散布する。 ○乾燥効果による落弁促進のため、ロイヤルシリカMG700倍を混用する。
		灰 星 病	パスワード顆粒水和剤 1,500倍(66g)	前日	2回以内		
		灰 炭 褐 色 せん 孔 病	オーソサイド水和剤80 800倍(125g)	3日前	5回以内		
⑤ /	5月中下旬 (5月20日頃)	灰 炭 褐 色 せん 孔 病	オーソサイド水和剤80 1,000倍(100g)	3日前	5回以内	500%	○コスシハの発生がみられる園では、スシハコンL40~100本/10aをこの時期までに設置する。 ○早生種の収穫前防除はこの回までとする。 ○カイガラムシ類の発生が見られる場合は、トランスフォームフロアブル1,000倍(7日前/3回以内)を単用散布する。
		カ イ ガ ラ ム シ 類 カ メ ム シ 類 オ ウ ト ウ シ ョ ウ ジ ョ ウ バ エ	モスピラン顆粒水溶剤 2,000倍(50g)	前日	1回		
⑥ /	6月上旬	灰 星 病 炭 褐 色 せん 孔 病 黒 斑 病	オンリーワンフロアブル 2,000倍(50cc)	前日	3回以内	400%	○カメムシ類、オウトウショウジョウバエの発生がみられる場合はダントツ水溶剤2,000倍(前日/2回以内)を加用散布する。
		ハ ダ ニ 類	ダニコングフロアブル 2,000倍(50cc)	前日	1回		

2022年度 JA山形おきたま さくらんぼ 病 害 虫 防 除 基 準 ②

桜桃振興部会

月日	散布時期	対象病害虫	薬剤名及び濃度(水100%当り薬量)	収穫前使用日	総使用回数	散布量(10a)	注意事項
⑦ /	6月中旬	灰星病 炭そ病 褐色せん孔病 黒斑病 ハマキムシ類、ケムシ類、オウトウショウジョウバエ、コスカシバ	ナリアWDG 2,000倍(50g)	前日	3回以内	400% %	・ハダニ類の発生が見られる場合はアカリタッチ乳剤を使用することが出来る。物理的(気門封鎖)に作用する剤の為、抵抗性がつく恐れはほとんどないと考えられ、連続散布が可能である。 ●アカリタッチ乳剤(殺ダニ剤)の使用方法● ・3,000倍(前日/ー)で散布し、殺卵効果がないため5~7日間隔で2~3回、葉に十分付着するようていねいに散布する。なお、展着剤は加用せず単用散布する。 ・果実黄化期や黄色品種(月山錦など)は果実に薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。
			エクシレルSE 2,500倍(40cc)	前日	3回以内		
⑧ /	6月下旬 ~ 7月上旬	灰星病 オウトウショウジョウバエ	インダーフロアブル 5,000倍(20cc)	前日	2回以内	400% %	○収穫が7月以降も続き、オウトウショウジョウバエの発生が見られる場合にはスタークル顆粒水溶剤2,000倍(前日/2回以内)を散布する。
			アーデントフロアブル 2,000倍(50g)	前日	3回以内		
収穫後は、花芽充実のために病害虫(ハダニ類・せん孔病・炭そ病)防除を徹底する。							
⑨ /	収穫直後	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	-	-	500% %	○今後急速にハダニが発生しやすくなる時期なので、散布ムラのないように、十分な量を散布する。 ○収穫が終了しない園地が近くにある場合は、飛散に注意する。 ○これ以降もハダニ類の発生が見られる園地では、ダニゲッターフロアブル2,000倍(前日/1回)を単用散布する。なお、ダニゲッターフロアブルは開花期の水稲(8月上旬頃)に薬害が発生する恐れがあるので、水田に隣接する園地では、水稲の開花期間を避けて散布する。
		褐色せん孔病 炭	トレノックスフロアブル 500倍(200cc)	21日前	5回以内(但し、萌芽後は2回以内)		
		ケムシ類	スミチオン水和剤40 800倍(125g)	14日前	2回以内		
		ハダニ類	コロマイト乳剤 1,000倍(100cc)	7日前	1回		
⑩ /	7月下旬 (前回散布の10日後)	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	-	-	500% %	○ナミハダニの発生がみられる場合は、コテツフロアブル2,000倍(7日前/2回以内)を散布する。 ○カイガラムシ類の発生が多い場合はアブロードフロアブル1,500倍(7日前/2回以内)を単用散布する。
		褐色せん孔病	オキシンドー水和剤80 1,200倍(83g)	収穫終了後 ~ 落葉期まで	3回以内		
⑪ /	8月中旬	固着性展着剤	アビオン-E 1,000倍(100cc)	-	-	500% %	○コスカシバの発生が見られる園地では、フェニックスフロアブル4,000倍(前日/2回以内)を枝幹部に丁寧に単用散布する。
		褐色せん孔病 樹脂細菌病	ICボルドー66D 40倍(2.5kg)	-	-		
		アブラムシ類 ハマキムシ類 ウメシロカイガラムシ	ダイアジノン水和剤34 1,000倍(100g)	14日前	2回以内		
⑫ /	落葉期	展着剤	アブローチBI 1,000倍(100cc)	-	-	350% %	○10月下旬~11月上旬に雑草対策及び野鼠対策としてバスタ液剤(前日/3回以内)またはザクサ液剤(前日/3回以内)を散布する。 ○ラビキラー乳剤は枝幹部に十分散布する。(降雨後に散布するとより浸透しやすい)。 ○褐色せん孔病が多い園地では、ラビキラー乳剤散布後10日以上空けて、ICボルドー66D 40倍を散布する。(樹脂細菌病に適用がある) ○野鼠対策として根雪前にフジワン粒剤1樹当たり200gを、樹冠下半径50cmの範囲の土壌と均一に混和する。(使用回数2回以内)
		コスカシバ	ラビキラー乳剤 200倍(500cc)	落葉後~ 発芽前 (休眠期)	1回		

この防除基準は、令和3年11月24日現在の適用内容により作成しています。

2022年度 JA山形おきたま デラウェア施設栽培 病害虫防除基準① ぶどう振興部会

月日	散布時期	対象病害虫	薬剤名・混用順序・倍数 (薬量/水100%)	収穫前使用時期 総使用回数	散布量(10a)	注意事項	
<p>ブドウトラカミキリ防除は落葉後の秋冬期防除の効果が高い。散布しなかった圃地は石灰硫黄合剤散布前にラビキラー乳剤300倍(発芽前/2回以内)を散布する。</p> <p>コウモリカ(キクイムシ)対策→粗皮剥ぎや樹幹の周囲を清掃し、見つけ次第捕殺する。</p>							
① /	発芽前	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	—	200 $\frac{L}{ha}$	<ul style="list-style-type: none"> ○春季にラビキラー乳剤を散布した場合、7~10日間、間隔をあけて散布する。 ○ブドウサビダニ・ハモグリダニや褐斑病の多い圃地では必ず散布する。 ○コウモリカ等枝幹害虫対策として、被害がみられる圃地は、萌芽後に「ガットサイド」S1.5倍液(21日前/2回以内)を主幹部に塗布する。キクイムシ類に対する効果も期待できる。 ○カキリムシ類(枝幹害虫)対策として、加害(食入孔)がみられる場合は「ロソフット」(前日/5回以内)を使用する。食入孔に専用ノズル先端を差し込み、薬液が食入孔から逆流するまで2~10秒間噴射しながら押し込むことにより、ノズルが詰まらず樹内の殺虫効果が安定する。 	
		ハダニ類、サビダニ類	石灰硫黄合剤 20倍(5%)	発芽前 —			
/	特別散布 (発芽直後)	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	—	200 $\frac{L}{ha}$	<ul style="list-style-type: none"> ○カスカムシ類に対する効果も期待される。結果母枝基部の繭芽がほぐれ、薄い緑色部分が見え始めた時が防除適期なので、防除が遅れないようにする。また、棚の上下から丁寧に散布する。 ○周囲にモギが自生している場合は、カスカムシ類の繁殖場所となるので除草を徹底する。 	
		フタテンヒメヨコバイ	サイアノックス水和剤 1,000倍(100g)	21日前まで 2回以内			
② /	第1回ハダニ防除 展葉 5~7枚	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	—	200 $\frac{L}{ha}$	<ul style="list-style-type: none"> ○ハダニ防除にあたっては、散布ムラが出ないように注意し、早めの防除を徹底する。 ○ベンコゼブフロアブルの防除時期は、「開花前まで」なので注意する。 ○ブドウトラカミキリ対策として、せん定枝は5月下旬までに処分する。 <div data-bbox="1176 651 2011 778" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>【デラウェア 種子混入防止】 アグレプト液剤/ストマイ液剤20 使用方法 希釈倍数 1,000倍 使用回数 1回 満開予定日の14日前~満開期 花房浸漬 (第1回目ジベレリン処理と併用) フリーデラや例年種子混入がみられる圃地では、第1回目GA液に必ず混用する。</p> </div> <div data-bbox="1176 790 1877 906" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>【ジベレリンを効かせる管理】 高温乾燥下ではジベレリンの吸収が劣るので、展葉期から定期的にかん水するとともに極端に乾燥している場合は、ジベ処理当日にかん水をする。処理できない場合は棚面散水を実施し、湿度確保に努める。</p> </div>	
		べと病、黒とう病、晩腐病、褐斑病	ベンコゼブフロアブル 1,000倍(100cc)	開花前まで 2回以内			
		アザミウマ類、フタテンヒメヨコバイ、カイガラムシ類、ツマゴロアオカスミカメ	モスピラン顆粒水溶剤 2,000倍(50g)	14日前まで 3回以内			
		ハダニ類、ブドウサビダニ	マイトコーネフロアブル 1,000倍(100cc)	21日前まで 1回			
③ /	灰かび重点防除 開花直前	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	—	200 $\frac{L}{ha}$	<ul style="list-style-type: none"> ○スウィッチ顆粒水和剤は桜桃の葉に薬害を生じるので、近隣に桜桃がある場合はスウィッチ顆粒水和剤に代えてゲッター水和剤1,500倍(45日前/1回)を使用する。 ○開花期前後は、灰色かび病にかかりやすい時期なので、ハウス内が多湿にならないよう換気を徹底する。 ○害虫の発生が早い場合は、7デイオン水和剤2,000倍(7日前/5回)を加用散布する。 <div data-bbox="1176 1013 1877 1104" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>灰色かび病など様々な病害虫の重点防除時期となるので、防除タイミングを逃さず薬液を十分量散布する。</p> </div>	
		灰色かび病、晩腐病	スウィッチ顆粒水和剤 2,000倍(50g)	30日前まで 2回以内			
④ /	灰かび重点防除 第2回ハダニ防除 落花直後 (花かすが残っている時期で2回目ジベ処理前まで)		ファンタジスタ顆粒水和剤 3,000倍(33g)	14日前まで 3回以内	200 $\frac{L}{ha}$	<ul style="list-style-type: none"> ○ハウス谷間部の果房は6月上旬までサカケを行う。 ○カイガラムシ類の発生が見られる場合はアフロートフロアブル1,000倍(30日前/2回以内)を単用散布する。ただし、散布が遅くなると果粉溶脱が懸念されるので、散布時期は小豆粒大までとする。 ○花かす取り作業軽減のため、ロイヤルシカMG700倍またはシキョーゼオ1,000倍を加用散布する。 ○コロマイト水和剤は果粉溶脱が懸念されるため、遅れないで散布する。また、ダニ剤はこのタイミングで必ず散布する。 <div data-bbox="1176 1295 1937 1412" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>加温ハウスは過湿により、灰色かび病が発生しやすい。落花直後の防除以降、天候不順等により灰色かび病の発生が懸念される場合にはインダーフロアブル8,000倍(30日前/3回以内)を散布する。散布時期によっては果粉溶脱が懸念されるため、スプレーノズルを使用し、散布量にも注意する。</p> </div>	
		灰色かび病、晩腐病、黒とう病、さび病		ダントツ水溶剤 2,000倍(50g)			前日まで 3回以内
		ハダニ類		コロマイト水和剤 2,000倍(50g)			7日前まで 2回以内

2022年度 JA山形おきたま デラウェア施設栽培 病害虫防除基準② ぶどう振興部会

月日	散布時期	対象病害虫	薬剤名・混用順序・倍数 (薬量/水100%)	収穫前使用時期 総使用回数	散布量(10a)	注意事項
これ以降の防除は汚染や果粉溶脱に注意 【散布量】【希釈倍数】【噴口・噴板】を再点検!! ★ 飛散にも十分注意! ★						
/	着色期前 特別散布	灰色かび病、褐斑病、うどんこ病、黒とう病、晩腐病、すす点病	オンリーワンフロアブル 2,000倍(50cc)	前日まで 3回以内	100~150%	○スラン噴口を使用し果粉溶脱に注意する。 ○モンキクノメイガが見られる園地では、サムコルフロアブル10 5,000倍(前日/3回以内)を棚の上下から散布する。棚下散布は、果粉溶脱が懸念されるので、スラン噴口を使用する。 ○晩腐病の発病果は見つけたい摘み取り、適切に処分する。
		アザミウマ類、ハダニ類、フタテンヒメヨコバイ、コガネムシ類	アーデントフロアブル 2,000倍(50cc)	前日まで 4回以内		
/	着色期前 特別散布	ハダニ類	ダニコングフロアブル 2,000倍(50cc)	前日まで 1回	100~150%	○ハダニが多発すると、種枝の登熟が劣ったり、貯蔵養分蓄積に悪影響があるので、ハダニの発生が心配される場合は、この回の防除を確実にを行う。散布においては果粉溶脱に注意する。
⑤ /	収穫後	べと病	ICボルドー66D	—	300%	○ハダニ類、フトウサビタニの発生が見られる場合には、タニコングフロアブル2,000倍(30日前/1回)を単用で散布する。 ○被覆したままの状態では、棚面の上下から十分量を散布し、枝幹害虫防除のため、主幹にも薬液がしっかりかかるようにする。また、高温時期の散布は葉害の恐れがあるため、時期をずらして散布する。 ○収穫後、降雨が多い場合は、8月下旬~9月上旬にICボルドー66D50倍を追加散布する。
		さび病	50倍(2kg)	—		
/	休眠期	ブドウトラカミキリ、ブドウスカシバ、フタテンヒメヨコバイ、コガネムシ類成虫、クワコナカイガラムシ	スミチオン水和剤40 1,000倍(100g)	90日前まで 2回以内	200%	○房の取り残り部分や巻きひげ、結果母枝の枯死部分等は除去する。 ○スミチオン水和剤40、ラビキラー乳剤、カットサイドSは、同一成分を含み、総使用回数4回以内(但し、収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内)とする。
		展着剤	アプローチBI 1,000倍(100cc)	—		
		ブドウトラカミキリ	ラビキラー乳剤 300倍(330cc)	発芽前(休眠期) 2回以内		
【注意】デラウェアに使用できないか、使用に必要な農薬						
ぶどうで使用ができなくなった農薬→ (ぶどうの登録削除)		ジェイエース水溶剤(オルトランを含む農薬)		近年、登録が変更された農薬→		コテツフロアブル(収穫前日数14日前→60日前)、 ダニトロンフロアブル(収穫前日数14日前→30日前)
デラウェアで使用できない農薬→ (大粒ぶどうのみの登録)		ダイアジノン水和剤34、パダンSG水溶剤、バイスロイドEW、アディオフロアブル、ピラニカ水和剤、カンタスドライフロアブル、ナリアWDG				
着色障害防止に肥料用硫酸マンガ				CX-10の使用法		
使用方法及び時期		○ 第2回ジベレリン処理時に混用の場合 硫酸マンガ 14.5cc / ジベレリン液2% ○ 満開20日後の棚面散布の場合 硫酸マンガ 365cc / 水 100%		○休眠打破、萌芽促進、発芽率向上(発芽揃い)に効果がみられる。 ○処理時期は、例年11月中下旬以降。積雪により処理できなかった場合でも水揚げ前までに処理すると、発芽を揃える効果はある。(生育促進効果は劣る) ○処理にあたっては、種枝(芽、葉柄痕、節間)にたっぷり散布する。再処理や重複散布はしない。 ○倍数 20倍 ○散布量の目安: 150%/10a ○展着剤加用 ハイテンパワー 10,000倍		

この防除基準は、令和3年11月24日現在の適用内容により作成しています。

2022年度 JA山形おきたま デラウエア露地栽培 病虫害防除基準 ① ぶどう振興部会

月日	散布時期	対象病虫害	薬剤名・混用順序・倍数 (薬量/水100%)	収穫前使用時期 総使用回数	散布量(10a)	注意事項
① /	休眠期	展着剤 晩腐病 黒とう病 ブドウトラカミキリ	アブローチBI 1,000倍(100cc) ベフラン液剤25 250倍(400cc) ラビキラー乳剤 300倍(330cc)	— 休眠期 1回 発芽前(休眠期) 2回以内	200 ^{リットル}	○カイガラムシ類やカスミカメシ類が見られる園では、粗皮削りを必須作業とし、休眠期防除前までに終わらせる。 ○前年の房の取り残し部分や巻きひげ、結果母枝の枯死部分等は除去する。 ○周囲に訪花昆虫の巣箱がある場合には秋処理とする。 ○ベフラン液剤25に代えてフリトフロアブル25 1,000倍(休眠期/1回)を使用しても良い。
コウモリカ・(キクイムシ)対策→粗皮剥ぎや樹幹の周囲を清掃し、見つけ次第捕殺する。						
② /	発芽前	展着剤 ハダニ類、サビダニ類	ハイテンパワー 10,000倍(10cc) 石灰硫黄合剤 20倍(5 ^{リットル})	— 発芽前 —	200 ^{リットル}	○春季にラビキラー乳剤を散布した場合、7~10日間、間隔をあけて散布する。 ○フトウサビダニ・ハモグリタニや褐斑病の多い園では必ず散布する。 ○コウモリカ等枝幹害虫対策として、被害がみられる園地は、萌芽後にガットサイトS1.5倍液(21日前/2回以内)を主幹部に塗布する。キクイムシ類に対する効果も期待できる。 ○カキリムシ類(枝幹害虫)対策として、加害(食入孔)がみられる場合はロシソッド(前日/5回以内)を使用する。食入孔に専用ノズル先端を差し込み、薬液が食入孔から逆流するまで2~10秒間噴射しながら押し込むことにより、ノズルが詰まらず樹内の殺虫効果が安定する。
枝かけ具の取付け(晩腐病発生が多い園は100%実施)→休眠期~5葉期まではかけ終わる事。風等でずれた場合は随時手直しをする。						
③ /	発芽直後	展着剤 フタテンヒメヨコバイ	ハイテンパワー 10,000倍(10cc) サイアノックス水和剤 1,000倍(100g)	— 21日前まで 2回以内	200 ^{リットル}	○カスミカメシ類に対する効果が期待される。結果母枝基部の綿芽がほぐれ、薄い緑色部分が見え始めた時が防除適期なので、防除が遅れないようにする。また、棚の上下から丁寧に散布する。 ○周囲にヨモギが自生している場合は、カスミカメシ類の繁殖場所となるので除草を徹底する。
④ /	展葉5~7枚	展着剤 べと病、黒とう病、晩腐病、褐斑病 アザミウマ類、フタテンヒメヨコバイ、カイガラムシ類、ツマグロアオカスミカメ	ハイテンパワー 10,000倍(10cc) ペンコゼブフロアブル 1,000倍(100cc) モスピラン顆粒水溶剤 2,000倍(50g)	— 60日前まで 2回以内 14日前まで 3回以内	200 ^{リットル}	○フトウトラカミキリ対策として、せん定枝は5月下旬までに処分する。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">[デラウエア 種子混入防止] アグレプト液剤/ストマイ液剤20 使用方法 希釈倍数 1,000倍 使用回数 1回 満開予定日の14日前~満開期 花房浸漬 (第1回目ジベレリン処理と併用) フーデラや例年種子混入がみられる園地では、第1回目GA液に必ず混用する。</div>
⑤ /	開花直前 (第1回ジベ処理後)	べと病、さび病、晩腐病 ハダニ類	ICボルドー66D 50倍(2kg) コロマイト水和剤 2,000倍(50g)	— 7日前まで 2回以内	200 ^{リットル}	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">[ジベレリンを効かせる管理] 高温乾燥下ではジベレリンの吸収が劣るので、展葉期から定期的にかん水するとともに極端に乾燥している場合は、ジベ処理当日にかん水をする。処理できない場合は棚面散水を実施し、湿度確保に努める。</div> ○カイガラムシ類の発生が見られる園は、アブローチフロアブル1,000倍(30日前/2回以内)を単用散布する。果粉溶脱に注意する。

2022年度 JA山形おきたま デラウエア露地栽培 病虫害防除基準 ② ぶどう振興部会

月日	散布時期	対象病虫害	薬剤名・混用順序・倍数 (薬量/水100%)	収穫前使用時期 総使用回数	散布量(10a)	注意事項
第2回 ジベ処理 前後		晩腐病対策のためパラソルかけ100%実施				
		1.かさかけと結果母枝への枝かけ具の併用は更に効果が高い。		3.かさかけが遅れると効果が劣る。		
		2.かさかけは雨漏りを防ぐため果軸に密着するよう丁寧に。		4.かさかけは6月中旬まで終了する。		
これ以降の防除は汚染や果粉溶脱に注意 【散布量】【希釈倍数】【噴口・噴板】を再点検！！ ★飛散にも十分注意！★						
⑥ /	落花直後～ (花かすが残っている時期で2回目ジベ処理前まで)	灰色かび病、晩腐病、褐斑病、黒とう病、さび病、すす点病、うどんこ病 べと病 アザミウマ類、ハダニ類、フタテンヒメヨコバイ、コガネムシ類	オンリーワンフロアブル 2,000倍(50cc) ベトファイター顆粒水和剤 3,000倍(33g) アーデントフロアブル 2,000倍(50cc)	前日まで 3回以内 30日前まで 3回以内 前日まで 4回以内	200 ^{リットル}	べと病防除対策 ○発生が懸念される場合は、天気予報等に注意し予防防除を徹底する。 ○葉裏の気孔からの侵入を防ぐ目的で十分に散布する。 ○同一成分の薬剤の連用は避ける。 ○降雨が続く場合は、耐雨性に優れるジャストフィットフロアブル5,000倍(30日/3回以内)を追加散布する。 ※ジャストフィットフロアブルについては、ベトファイター顆粒水和剤と同成分を含むため、総使用回数(3回)に注意する。 ○モンキクノメイガが見られる園地では、サムコフロアブル10 5,000倍(前日/3回以内)を棚の上下から散布する。棚下散布は、果粉溶脱が懸念されるので、スラン噴口を使用する。
⑦ /	7月上旬	べと病、さび病	棚上散布 ICボルドー66D 50倍(2kg)	—	250 ^{リットル}	○散布時期が遅れないよう、適期防除に努める。 ○ハダニ類の発生がみられる園地では、ダニコングフロアブル2,000倍(前日/1回)を単用散布する。
⑧ /	7月中旬	灰色かび病、晩腐病、黒とう病、さび病	ファンタジスタ顆粒水和剤 3,000倍(33g)	14日前まで 3回以内	150 ^{リットル}	○果粉溶脱の恐れがあるので、倍数を厳守し十分攪拌後、重複しないようスラン噴口等を使用し散布する。 ○フタテンヒメヨコバイの発生が多い園地は、タンツク水溶剤2,000倍(前日/3回以内)を散布する。 ○晩腐病の発病果は見つけしだい摘み取り、適切に処分する。
⑨ /	7月下旬	べと病、さび病	棚上散布 ICボルドー66D 50倍(2kg)	—	250 ^{リットル}	○冷蔵庫で貯蔵する園地では、灰色かび病対策として、収穫前にオンリーワンフロアブル 2,000倍(前日/3回以内)を果粉溶脱に注意し単用散布する。
⑩ /	収穫直後	べと病、さび病 ブドウトラカミキリ、コガネムシ類成虫、ブドウスカンバ、クワコナカイガラムシ、フタテンヒメヨコバイ	ICボルドー66D 50倍(2kg) スミチオン水和剤40 1,000倍(100g)	— 90日前まで 2回以内	300 ^{リットル}	○散布量を増やし、棚面上下から十分散布する。 ○スミチオン水和剤40、ラビキラー乳剤、カッツサイドSは、同一成分を含み、総使用回数4回以内(但し、収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内)とする。 ○スカシバ等の枝幹害虫対策は、薬液が主幹に十分かかるようにする。
着色障害防止に肥料用硫酸マンガ			ブドウサビダニ被害の特徴			
使用方法及び時期	○ 第2回ジベ処理液に混用の場合 硫酸マンガ 14.5cc / ジベ液2^{リットル} ○ 満開20日後の棚面散布の場合 硫酸マンガ 365cc / 水 100^{リットル}		○葉の表面の葉脈付近に生息し、虫がネ等で確認できない。 ○先端の若葉よりも成葉に被害が多い。 ○葉脈にそって黒褐色になり、被害が進行すると葉全体が変色し葉緑から枯込む。 ○発芽前の石灰硫黄合剤を丁寧に散布すれば、発生は少ない。			

この防除基準は、令和3年11月24日現在の適用内容により作成しています。

2022年度 JA山形おきたま 大粒種（施設高尾・ピオネ・安芸クーン等）病害虫防除基準 ① 大粒ぶどう振興部会

散布月日	散布時期	対象病害虫	薬剤名・混用順序・倍数 (薬量/水100%)	収穫前使用時期 総使用回数	散布量 (10a)	注意事項
ブドウトラカミキリ防除は落葉後の秋冬期防除の効果が高い。散布しなかった園地は、石灰硫黄合剤散布前にラビキラー乳剤300倍（発芽前／2回以内）を散布する。						
クビアカスカシバ・コウモリガ・ブドウスカシバ・キクイムシの被害が増えている。粗皮剥ぎや樹幹の周囲を清掃するなどの耕種的防除を行うとともに、見つけ次第捕殺する。						
① ／	発芽前	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	—	200%	○昨年、晩腐病が発生した園地では、石灰硫黄合剤散布前にベフラン液剤25・250倍(休眠期/1回)を散布する。 ○春季にベフラン液剤25、ラビキラー乳剤を散布した場合は石灰硫黄合剤と7～10日間、間隔をあける。 ○ブドウサビダニ・ハモグリダニや褐斑病の多い園地では必ず散布する。 ○コウモリガ等枝幹害虫対策として、被害がみられる園地は、萌芽後に「ガットサイド」S1.5倍液(21日前／2回以内)を主幹部に塗布する。キクイムシ類に対する効果も期待できる。 ○かきムシ類(枝幹害虫)対策として、加害(食入孔)がみられる場合はロビンフッド(前日/5回以内)を使用する。食入孔に専用ノズル先端を差し込み、薬液が食入孔から逆流するまで2～10秒間噴射しながら押し込むことにより、ノズルが詰まらず樹内の殺虫効果が安定する。
		ハダニ類、サビダニ類	石灰硫黄合剤 20倍(5%)	発芽前		
／	特別散布 (発芽直後)	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	—	200%	○カスカムシ類に対する効果も期待され、カスカムシの被害が多い園地では必ず散布する。結果母枝基部の綿芽がほぐれ、薄い緑色部分が見え始めた時が防除適期なので、防除が遅れないようにする。また、棚の上下から丁寧に散布する。 ○周囲にヨモギが自生している場合は、カスカムシ類の繁殖場所となるので除草を徹底する。 ○黒とう病の発生が懸念される場合は、展葉初期にテラフアブル1,000倍(落弁期まで、但し、収穫75日前まで/2回以内)を散布する。
		フタテンヒメヨコバイ	サイアノックス水和剤 1,000倍(100g)	21日前まで 2回以内		
② ／	展葉 5～7枚	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	—	200%	○ハダニは多発すると防除が困難になるので、初期防除に努める。 ○ブドウトラカミキリ対策として、せん定枝は5月下旬までに処分する。 ○無種子化処理が必要な品種は、満開予定日の14日前から開花始期にアクレプト液剤またはスマイ液剤1,000倍を散布する。処理が遅れると種子混入のリスクが高まるため、生育のばらつきを考慮し平均して展葉9枚頃を目安に実施する。また、かけムラがないようにしっかりと散布する。 ○満開時の散布は避ける。果実に発生したサビは、実割れの原因になるので注意する。 ○開花期前後は、灰色かび病にかかりやすい時期なので、ハウス内が多湿にならないよう換気を徹底する。 ○スイッチ顆粒水和剤は桜桃の葉に薬害を生じるので、近隣に桜桃がある場合はスイッチ顆粒水和剤に代えてゲッター水和剤1,500倍(45日前/1回)を使用する。 ○頻繁にうどんこ病が発生する園地では、インダーフロアブル8,000倍(30日前/3回以内)を散布する。
		べと病、黒とう病、晩腐病、うどんこ病、灰色かび病	テーク水和剤 1,000倍(100g)	45日前まで 2回以内		
		アザミウマ類、フタテンヒメヨコバイ、カイガラムシ類、ツマグロアオカシカメ	モスピラン顆粒水溶剤 2,000倍(50g)	14日前まで 3回以内		
		ハダニ類 ブドウサビダニ	マイトコーネフロアブル 1,000倍(100cc)	21日前まで 1回		
③ ／	【灰かび重点防除】 開花直前 6月上旬	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	—	200%	【クビアカスカシバ対策】 ○成虫の発生時期となるので、飛来防止のため防風ネットで施設全体を囲う。 ○最重要防除時期は6月～8月上旬。効果のある薬剤を定期的に散布する。 ○幼虫の枝幹部への食入時(樹皮を食害時)に効果ができるように枝幹部に十分かかるように散布する。 ○被害が多い園地では、前回散布2週間後にパダンSG水溶剤1,500倍(21日前/5回以内)またはフェニックスフロアブル4,000倍(14日前/2回以内)を枝幹にしっかりと散布する。 ○パダンSG水溶剤は大粒ぶどうのみの登録であるため、テラウェア等への飛散に注意する。 ○主幹の地際周りを除草するとともに、樹上の食入箇所を定期的にチェックし捕殺する。また、食入孔の虫糞を取り除き、ロビンフッド(前日/5回以内)のノズルを差し込み噴射する。さらに、一度食入した箇所を再度加害する傾向があるので、目印を付けて確認するようにする。
		灰色かび病、晩腐病	スイッチ顆粒水和剤 2,000倍(50g)	30日前まで 2回以内		
		チャノキイロアザミウマ、フタテンヒメヨコバイ、スカシバ類	パダンSG水溶剤 1,500倍(66g)	21日前まで 5回以内		
④ ／	【灰かび重点防除】 落花直後 【アザミウマ類重点防除】	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	—	200%	○カイガラムシ類の発生が見られる場合はアプロートフロアブル1,000倍(30日前/2回以内)を単用散布する。ただし、散布が遅くなると果粉溶脱が懸念されるので、散布時期は小豆粒大までとする。 ○例年すす点病が発生する園地では、房の上下からしっかりと散布する。 ○べと病の発生が懸念される場合は、ハトファイター顆粒水和剤3,000倍(30日前/3回以内)を散布する。降雨が続く場合は、耐雨性に優れたジャストフィットフロアブル5,000倍(30日前/3回以内)を追加散布する。※ジャストフィットフロアブルについては、ハトファイター顆粒水和剤と同成分を含むため、総使用回数(3回)に注意する。
		晩腐病、黒とう病、さび病、灰色かび病、うどんこ病、すす点病、褐斑病	オンリーワンフロアブル 2,000倍(50cc)	前日まで 3回以内		
		フタテンヒメヨコバイ、ハマキムシ類、チャノキイロアザミウマ	スカウトフロアブル 2,000倍(50cc)	7日前まで 3回以内		
		ハダニ類	コロマイト水和剤 2,000倍(50g)	7日前まで 2回以内		

2022年度 JA山形おきたま 大粒種（施設高尾・ピオーネ・安芸クーン等）病害虫防除基準 ② 大粒ぶどう振興部会

散布月日	散布時期	対象病害虫	薬剤名・混用順序・倍数 (薬量/水100%)	収穫前使用時期 総使用回数	散布量 (10a)	注意事項
これ以降の防除は汚染や果粉溶脱に注意 【散布量】【希釈倍数】【噴口・噴板】を再点検！！ ★ 飛散にも十分注意！ ★						
⑤ / 7月上旬 【アザミウマ類重点防除】		灰色かび病、黒とう病、さび病、褐斑病	パレード15フロアブル 2,000倍(50cc)	7日前まで 2回以内	200%	○モンクローメガ、クアカスガハが見られる園地では、サムコフロアブル10 5,000倍(前日/3回以内)を棚の上下から散布する。 ○その後の気温経過により灰色かび病の発生が見られる場合には、ストロートドライブフロアブル3,000倍(14日前/3回以内)を散布する。散布時期によっては果粉溶脱が懸念されるため、スラン噴口を使用し、散布量にも注意する。
		チャノキイロアザミウマ、フタテンヒメヨコバイ、カメムシ類、ブドウトラカミキリ、コガネムシ類、コナカイガラムシ類	ダントツ水溶剤 4,000倍(25g)	前日まで 3回以内		
		ハダニ類	ダニコングフロアブル 2,000倍(50cc)	前日まで 1回		
⑥ / 7月中下旬		灰色かび病、晩腐病、黒とう病、さび病	ファンタジスタ顆粒水和剤 3,000倍(33g)	14日前まで 3回以内	150%	
		アザミウマ類、フタテンヒメヨコバイ、ハダニ類、コガネムシ類	アーデントフロアブル 2,000倍(50cc)	前日まで 4回以内		
/ 8月中旬 ~ 8月下旬	特別散布	晩腐病、黒とう病、さび病、灰色かび病、うどんこ病、すす点病、褐斑病	オンリーワンフロアブル 2,000倍(50cc)	前日まで 3回以内	150%	○チャノキイロアザミウマやフタテンヒメヨコバイの発生が見られる場合はダントツ水溶剤2,000倍(前日/3回以内)を加用散布する。 ○裂果・腐敗果等は、見つけ次第除去する。
⑦ / 収穫直後		べと病、さび病	ICボルドー66D 50倍(2kg)	—	300%	○ハダニ類、ブドウサビダニの発生が見られる場合には、ダニトフロアブル2,000倍(30日前/1回)を散布する。(サビダニは葉表にもかかるように散布する。) ○副梢に結実した果房は早期に除去する。 ○収穫後、遅れないように棚面の上下から十分量を散布し、枝幹害虫防除のため、主幹にも薬液がしっかりとかかるようにする。
		ブドウトラカミキリ、ブドウスカシバ、コガネムシ類成虫、フタテンヒメヨコバイ、クワコナカイガラムシ	スミチオン水和剤40 1,000倍(100g)	21日前まで 2回以内		
⑧ / 休眠期		展着剤	アプローチBI 1,000倍(100cc)	—	200%	○晩腐病、黒とう病等防除のため、軸の取り残し部分や巻きひげ、結果母枝の枯死部分等は除去する。 ○スミチオン水和剤40、ラビキラー乳剤、カットサイトSは、同一成分を含み、総使用回数4回以内(但し、収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内)とする。
		ブドウトラカミキリ	ラビキラー乳剤 300倍(330cc)	発芽前(休眠期) 2回以内		

フラスター液剤の使用法 ※大粒ぶどうのみ抜粋

品種名	使用目的	使用時期	倍数	散布量ℓ/10a	総使用回数	品種名	使用目的	使用時期	倍数	散布量ℓ/10a	総使用回数	
巨峰	露地	新梢展開葉 7~11枚時 (開花始期まで)	1,000	300	2回	ナガノパープル	着粒増加 新梢伸長抑制	新梢展開葉 7~11枚時 (開花始期まで)	500~800	100~150	2回	
	施設		500~800	100~150			新梢伸長抑制	満開10~20日後 但し、収穫60日前まで	500	150		
巨峰系4倍体品種 (巨峰、ピオーネを除く)	2倍体米国系品種					500~800	100~150	2回	ピオーネ	着粒増加		新梢展開葉 7~11枚時 (開花始期まで)
3倍体品種 (ナガノパープルを除く)			新梢伸長抑制	満開10~20日後 但し、収穫60日前まで						500		150
2倍体欧州系品種 (シャインマスカットを除く)		1,000~2,000				着粒増加	新梢展開葉 7~11枚時 (開花始期まで)	1,000~2,000	100~150			
						新梢伸長抑制	満開10~20日後 但し、収穫60日前まで	500	150			
								1,000	300			

この防除基準は、令和3年11月24日現在の適用内容により作成しています。

2022年度 JA山形おきたま 大粒種 (施設 シャインマスクト、ザリア・ピアンコ) 病害虫防除基準 ① 大粒ぶどう振興部会

月日	散布時期	対象病害虫	薬剤名・混用順序・倍数 (薬量/水100%)	収穫前使用時期 総使用回数	散布量 (10a)	注意事項
ブドウトラカミキリ防除は落葉後の秋冬期防除の効果が高い。散布しなかった園地は、石灰硫黄合剤散布前にラビキラー乳剤300倍(発芽前/2回以内)を散布する。 クビアカスカシバ・コウモリガ・ブドウスカシバ・キクイムシの被害が増えている。粗皮剥ぎや樹幹の周囲を清掃するなどの耕種防除を行なうとともに見つけ次第捕殺する。						
① /	発芽前	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	-	200%	○昨年、晩腐病が発生した園地では、石灰硫黄合剤散布前にベフラン液剤25 250倍(休眠期/1回)を散布する。 ○春季にベフラン液剤25、ラビキラー乳剤を散布した場合は石灰硫黄合剤と7~10日間、間隔をあける。 ○ブドウザビダニ・ハモリガや褐斑病の多い園地では必ず散布する。 ○コウモリガ等枝幹害虫対策として、被害がみられる園地は、萌芽後にガットサイドS1.5倍液(21日前/2回以内)を主幹部に塗布する。キクイムシ類に対する効果も期待できる。 ○カミキリムシ類(枝幹害虫)対策として、加害(食入孔)がみられる場合はロソフツド(前日/5回以内)を使用する。食入孔に専用ノズル先端を差し込み、薬液が食入孔から逆流するまで2~10秒間噴射しながら押し込むことにより、ノズルが詰まらず樹内の殺虫効果が安定する。
		ハダニ類、サビダニ類	石灰硫黄合剤 20倍(5%)	発芽前		
/	特別散布 (発芽直後)	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	-	200%	○カスカムシ類に対する効果も期待され、カスカムシの被害が多い園地では必ず散布する。結果母枝基部の綿芽がほぐれ、薄い緑色部分が見え始めた時が防除適期なので、防除が遅れないようにする。また、棚の上下から丁寧に散布する。 ○周囲にヨモギが自生している場合は、カスカムシ類の繁殖の原因になるので除草を徹底する。 ○黒とう病の発生が懸念される場合は、展葉初期にテラフロアブル1,000倍(落葉期まで、但し、収穫75日前まで/2回以内)を散布する。
		フタテンヒメヨコバイ	サイアノックス水和剤 1,000倍(100g)	21日前まで 2回以内		
② /	展葉 5 ~ 7 枚	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	-	200%	○ハダニ類は、発生が多くなる前に初期防除に努める。 ○ブドウトラカミキリ対策として、せん定枝は5月下旬までに処分する。 ○シャインマスクは無種子化処理が必要な品種であるため、満開予定日の14日前から開花始期にアグレット液剤またはスマイ液剤1,000倍を散布する。処理が遅れると種子混入のリスクが高まるため、生育のばらつきを考慮し平均して展葉9枚頃を目安に実施する。また、かけムラがないようにしっかりと散布する。
		べと病、黒とう病、晩腐病、うどんこ病、灰色かび病	テーク水和剤 1,000倍(100g)	45日前まで 2回以内		
		アザミウマ類、フタテンヒメヨコバイ、カイガラムシ類、ツマグロアオカスカミ	モスピラン顆粒水溶剤 2,000倍(50g)	14日前まで 3回以内		
		ハダニ類 ブドウサビダニ	マイトコーネフロアブル 1,000倍(100cc)	21日前まで 1回		
③ /	【灰かび重点防除】 開花直前 6月上旬	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	-	200%	○満開時の散布は避ける。果実に発生したサビは実割れの原因になるので注意する。 ○開花期前後は、灰色かび病にかかりやすい時期なので、ハウス内が多湿にならないよう換気を徹底する。 ○スイッチ顆粒水和剤は桜桃の葉に葉害を生じるので、近隣に桜桃がある場合はスイッチ顆粒水和剤に代えてゲッター水和剤1,500倍(45日前/1回)を使用する。 ○頻繁にうどんこ病が発生する園地では、インダーフロアブル8,000倍(30日前/3回以内)を散布する。 ○クビアカスカシバ対策のため枝幹部にしっかりとかかるよう丁寧に散布する。
		灰色かび病、晩腐病	スイッチ顆粒水和剤 2,000倍(50g)	30日前まで 2回以内		
		チャノキイロアザミウマ、フタテンヒメヨコバイ、スカシバ類	パダンSG水溶剤 1,500倍(66g)	21日前まで 5回以内		
④ /	【灰かび重点防除】 落花直後 (シャインマスク第1 回目ジベ処理後) 【アザミウマ類重点防除】	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	-	200%	○満開時の散布は避ける。果実に発生したサビは実割れの原因になるので注意する。 ○開花期前後は、灰色かび病にかかりやすい時期なので、ハウス内が多湿にならないよう換気を徹底する。 ○スイッチ顆粒水和剤は桜桃の葉に葉害を生じるので、近隣に桜桃がある場合はスイッチ顆粒水和剤に代えてゲッター水和剤1,500倍(45日前/1回)を使用する。 ○頻繁にうどんこ病が発生する園地では、インダーフロアブル8,000倍(30日前/3回以内)を散布する。 ○クビアカスカシバ対策のため枝幹部にしっかりとかかるよう丁寧に散布する。 【クビアカスカシバ対策】 ○成虫の発生時期となるので、飛来防止のため防風ネットで施設全体を囲う。 ○最重点防除時期は6月~8月上旬。効果のある薬剤を定期的に散布する。 ○幼虫の枝幹部への食入時(樹皮を食害時)に効果がでるように枝幹部に十分かかるように散布する。 ○被害が多い園地では、前回散布2週間後にパダンSG水溶剤1,500倍(21日前/5回以内)またはフェニックスフロアブル4,000倍(14日前/2回以内)を枝幹部にしっかりと散布する。 ○パダンSG水溶剤は大粒ぶどうのみの登録であるため、テラウェア等への飛散に注意する。 ○主幹の地際周りを除草するとともに、樹上の食入箇所を定期的にチェックし捕殺する。また、食入孔の虫糞を取り除き、ロソフツド(前日/5回以内)のノズルを差し込み噴射する。さらに、一度食入した箇所を再度加害する傾向があるので、目印を付けて確認するようにする。 ○落花直後の防除実施後、7月上旬の防除までの間隔が1週間以上空く場合は、ファンタジス顆粒水溶剤3,000倍(14日前/3回以内)を追加散布する。 ○カイガラムシ類の発生が見られる場合はアプロードフロアブル1,000倍(30日前/2回以内)を単用散布する。ただし、散布が遅くなると果粉溶解が懸念されるので、散布時期は小豆粒大までとする。
		晩腐病、黒とう病、さび病、灰色かび病、うどんこ病、すす点病、褐斑病	オンリーワンフロアブル 2,000倍(50cc)	前日まで 3回以内		
		チャノキイロアザミウマ、フタテンヒメヨコバイ、ハマキムシ類	スカウトフロアブル 2,000倍(50cc)	7日前まで 3回以内		
		ハダニ類	コロマイト水和剤 2,000倍(50g)	7日前まで 2回以内		

2022年度 JA山形おきたま 大粒種 (シャインマスカット、ロザリオ・ピアンコ) 病害虫防除基準 ② 大粒ぶどう振興部会

月日	散布時期	対象病害虫	薬剤名・混用順序・倍数 (薬量/水100%)	収穫前使用時期 総使用回数	散布量 (10a)	注意事項
これ以降の防除は汚染や果粉溶脱に注意 【散布量】【希釈倍数】【噴口・噴板】を再点検!! ★ 飛散にも十分注意! ★						
⑤ /	7 月 上 旬 【アザミウマ類重点防除】	黒とう病、さび病、灰色かび病、褐斑病	パレード15フロアブル 2,000倍(50cc)	7日前まで 2回以内	200%	ダニ剤の有効な使用方法 ①同一成分の薬剤は連用しない。 ②支柱の部分等の初期発生を見逃さない。 ○モンキクノメイガ、クビアカシハが見られる圃地では、サムコフロアブル10 5,000倍(前日/3回以内)を棚の上下から散布する。 【簡易雨よけ・べと病梅雨期防除の実施】 ○べと病の発生が懸念される場合は、ベトファイター顆粒水和剤3,000倍(30日前/3回以内)を散布する。 ○降雨が続く場合は、耐雨性に優れたジャストフィットフロアブル5,000倍(30日前/3回以内)を追加散布する。※ジャストフィットフロアブルについては、ベトファイター顆粒水和剤と同成分を含むため、総使用回数(3回)に注意する。
		チャノキイロアザミウマ、フタテンヒメヨコバイ、カメムシ類、ブドウトラカミキリ、コガネムシ類、コナカイガラムシ類	ダントツ水溶剤 4,000倍(25g)	前日まで 3回以内		
		ハダニ類	ダニコングフロアブル 2,000倍(50cc)	前日まで 1回		
⑥ /	7 月 下 旬	晩腐病、黒とう病、さび病、灰色かび病、うどんこ病、すす点病、褐斑病	オンリーワンフロアブル 2,000倍(50cc)	前日まで 3回以内	200%	
		アザミウマ類、フタテンヒメヨコバイ、ハダニ類、コガネムシ類	アーデントフロアブル 2,000倍(50cc)	前日まで 4回以内		
⑦ /	8 月 中 旬 (袋かけ後)	黒とう病、べと病、褐斑病、晩腐病、灰色かび病、さび病、うどんこ病	ストロビードライフロアブル 3,000倍(33g)	14日前まで 3回以内	200%	○無袋でストロビードライフロアブル3,000倍の散布にあたっては、果粉溶脱の恐れがあるので、倍数を厳守し十分攪拌後、重複しないよう散布する。(スラン噴口使用) ○チャノキイロアザミウマやフタテンヒメヨコバイの発生が見られる場合はダントツ水溶剤2,000倍(前日/3回以内)を加用散布する。
⑧ /	8 月 下 旬 (ロザリオピアンコ)	黒とう病、灰色かび病、うどんこ病、褐斑病	オーシャインフロアブル 2,000倍(50cc)	7日前まで 2回以内	150%	○ロザリオピアンコ等、収穫が遅い品種のみ散布する。 ○果実汚染に注意し散布する。 ○裂果・腐敗果等は、見つけ次第除去する。
⑧ /	収 穫 直 後	べと病、さび病	ICポルドー66D 50倍(2kg)	—	300%	○ハダニ類、ブドウサビダニの発生が見られる場合には、ダニフロアブル2,000倍(30日前/1回)を散布する。(サビダニは葉表にもかかるように散布する。) ○副梢に結実した果房は早期に除去する。 ○収穫後、遅れないように棚面の上下から十分量を散布し、枝幹害虫防除のため、主幹にも薬液がしっかりとかかるようにする。
		コガネムシ類成虫、ブドウトラカミキリ、ブドウスカシバ、フタテンヒメヨコバイ、クワコナカイガラムシ	スミチオン水和剤40 1,000倍(100g)	21日前まで 2回以内		
⑨ /	休 眠 期	展着剤	アブローチBI 1,000倍(100cc)	—	200%	○晩腐病、黒とう病等防除のため、軸の取り残り部分や巻きひげ、結果母枝の枯死部分等は除去する。 ○スミチオン水和剤40、ラビキラー乳剤、ガットサイドSは、同一成分を含み、総使用回数4回以内(但し、収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内)とする。
		ブドウトラカミキリ	ラビキラー乳剤 300倍(330cc)	発芽前(休眠期) 2回以内		

灰色かび病・べと病・すす点病・うどんこ病対策について

1. 予防散布が基本であるので、生育初期～水まわり期までの、薬量を多く散布できる期間が防除のポイントとなるので、かけむらのないように徹底して行う。
2. 灰色かび病は、花穂や穂軸・葉・幼果・熟果に発病する。特に、開花期前後及び幼果期が防除のポイントとなる。(薬量多く開花期前後のハウス内の湿度が高いと、突発的に発病することがあるので、適宜、換気を行いハウス内が過湿にならないようにする。)
3. べと病は開花期から幼果期にかけて、雨水によって葉・幼果等に感染するので、5月中下旬及び開花期以降10日間隔で定期的に防除する。
4. すす点病は、5月上～中旬頃から分生子が風で飛散感染し、果粉を栄養源として増殖する。7月中旬から果粒での病斑が見られ二次伝染源となる。幼果期の通風・換気を十分行い落花後から7月中下旬までに、散布間隔があかないよう防除を行う。
5. うどんこ病は、分生子が風で飛散感染し、開花期～幼果期に発生が見られる。とくに冷涼少雨条件下で多発する。発芽前以降～幼果期ころまで散布間隔があかないよう効果のある農薬を散布する。

CX-10(シアナミド10%)の使用方法

- 休眠打破、萌芽促進、発芽率向上(発芽揃い)に効果が期待されるので、発芽の不揃いな品種には有効。
- 処理時期は、デラウェアは11月中下旬頃～、シャインマスカットは11月末または12月上旬頃～、ロザリオピアンコは12月10日頃が目安。但し、低温遭遇時間が少ない場合は、処理時期を遅らせる。処理が遅れても水揚げ前までに処理すると発芽を揃える効果がある。
- 処理にあたっては、種枝(芽、葉柄痕、節間)にたっぷり散布し、再処理や重複散布を避ける。
- 使用回数: 10倍(1回以内)～15倍(2回以内)または20倍(2回以内) 散布量の目安: 150%/10a ※倍数および散布量は品種等により調整する。
- 展着剤使用 ハイテンパワー10,000倍

この防除基準は、令和3年11月24日現在の適用内容により作成しています。

2022年度 JA山形おきたま りんご(ホルト-体系) 害虫防除基準 ① りんご振興部会

月日	時期	対象病害虫	薬剤名及び濃度(水100%当り薬量)	収穫前使用回数	総使用回数	散布量(10a)	葉面散布肥料資材	注意事項
① ／	発芽直前	—	水 (88%)	※水88ℓにハーベストオイル2ℓ+石灰硫黄合剤10ℓを希釈する。(合計100ℓ)	—	—	—	○薬剤散布前に粗皮削りを行い、枝幹部に十分薬液がかかるよう丁寧に散布する。 ○リンコハニおよびジナルカイラムシの越冬密度が高い園地では、マシン油乳剤を必ず散布する。 ○降雪の遅い地帯では、発芽期から展葉期にハーベストオイル200倍(発芽後3週間まで-)とベフラン液剤251,000倍(展葉期/6回以内※但し、開花期以降散布は3回以内)、ダイジノ水和剤341,000倍(30日前/4回以内)混用して散布する。
		ハダニ類、カイガラムシ類	ハーベストオイル 50倍 (2%)	発芽前	—	300%	—	
		越冬病害虫、腐らん病、カイガラムシ類、ハダニ類	石灰硫黄合剤 10倍 (10%)	発芽前	—	—	—	
② ／	展葉初期 (4月中旬) 【花そう葉が2~3枚展葉した頃】	黒星病	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍 (10cc)	—	—	400%	○訪花昆虫を保護するため、活動時間前(早朝)に散布を行う。 ○黒星病の発生が多い場合は、トレノックスフロアブルに代えてICホルト-412 30倍(-/-)を散布する。ただし、ハーベストオイル等マシン油乳剤の散布後は、2~3日以上経過してからICホルト-412を散布する(マシン油乳剤の効果低下の防止)。
		黒星病、黒点病、褐斑病、すす点病、すす斑病、炭そ病、輪紋病	トレノックスフロアブル 500倍 (200cc)	30日前	5回以内	—		
		アブラムシ類、シンクイムシ類、カイガラムシ類、キンモンホソガ、キンモンハマグリガ	モスピラン顆粒水溶剤 4,000倍 (25g)	前日	3回以内	—		
③ ／	展葉10日後	黒星病	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍 (10cc)	—	—	400%	○前年、黒星病の発生が多かった園地では、間隔があかないよう展葉10日後の防除を必ず実施する。 ○黒星病の発生が多い場合は、ストライド顆粒水和剤に代えてICホルト-412 30倍(-/-)を散布する。 【カイガラムシ防除】 前年にジナルカイラムシが多発した園地では、アブロードフロアブル1,000倍(30日前/2回以内)を加用する。枝幹部に十分かかるよう丁寧に散布する。
		黒星病、モニリア病	ストライド顆粒水和剤 1,500倍 (66g)	開花前まで	2回以内	—		
④ ／	開花直前 (4月下旬)	黒星病	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍 (10cc)	—	—	400%	○訪花昆虫を保護するため、活動時間前(早朝)に散布を行う。 ○モニリア病対策として、発病した葉や花、花そうは摘み取り、適切に処分する。 ○ユニックス顆粒水和剤47は、耐性菌発生が心配されるため、この回の1回のみ散布とする。
		黒星病、斑点落葉病、うどんこ病、モニリア病	ユニックス顆粒水和剤47 1,000倍 (100g)	14日前	4回以内	—		
		黒星病、赤星病、褐斑病、斑点落葉病、黒点病、炭そ病	ペンコゼブ水和剤 600倍 (166g)	30日前	3回以内	—		
		ハマキムシ類、ケムシ類	フェニックスフロアブル 5,000倍 (20cc)	前日	2回以内	—		
⑤ ／	落花直後 中心花が7~8割落花 (5月上旬)	黒星病、赤星病、モニリア病、うどんこ病、褐斑病、斑点落葉病、黒点病、すす点病、すす斑病	アスパイア水和剤 500倍 (200g)	30日前	3回以内	500%	果面保護 ハイカルティ または リフレッシュ 1,000倍	○ウララDFは訪花昆虫に対する影響が少ない。 ○近年、リンゴワタムシの発生が増加傾向なので、散布ムラがないよう、樹幹全体に満遍なく散布する。 ○黒星病が多い園地では、落花10日後にアントコール顆粒水和剤500倍(45日前/4回以内)を追加散布する。
		アブラムシ類、リンゴワタムシ	ウララDF 2,000倍 (50g)	14日前	2回以内			
⑥ ／	5月中下旬	黒星病、赤星病、モニリア病、うどんこ病、褐斑病、すす点病、すす斑病、炭そ病、輪紋病	トレノックスフロアブル 500倍 (200cc)	30日前	5回以内	600%	果面保護 ハイカルティ または リフレッシュ 1,000倍	○キンモンハマグリガにも効果がある。 ○ハマキムシ類、シンクイムシ類対策として、コンフェーザ-Rを10a当たり100本設置する。
		カメムシ類、シンクイムシ類、リンゴワタムシ	バリアード顆粒水和剤 2,000倍 (50g)	前日	3回以内			
⑦ ／	6月上旬	黒星病(二次感染)・斑点落葉病	斑点落葉病、黒点病、褐斑病、黒星病、輪紋病、炭そ病	アントコール顆粒水和剤 500倍 (200g)	45日前	4回以内	果面保護 ハイカルティ または リフレッシュ 1,000倍	○余分な徒長枝は、防除の妨げになるので整理する。 ○黒星病対策として、発病した葉や果実は、見つけたい摘み取り、適切に処分する。 【ヒメボケリ防除】 園内をよく観察し、被害の兆候(樹幹からのフラス(虫糞と木屑の混ざったもの)の排出の有無)の早期発見に努め、被害を発見した場合は、フラスを取り除きピシソット(前日/5回以内)のノズルを排出孔に差し込み薬液がでるまで噴射する。
		シンクイムシ類、アブラムシ類、キンモンホソガ、ハマキムシ類	アデオン水和剤 2,000倍 (50g)	14日前	2回以内			
		ハダニ類	ダニコングフロアブル 2,000倍 (50cc)	前日	1回			
⑧ ／	6月中旬	腐らん病	固着性展着剤	アビオン-E 1,000倍 (100cc)	—	—	果面保護 ハイカルティ または リフレッシュ 1,000倍	○腐らん病の発生が見られる園では、摘果痕からの感染防止のため、トップジンM水和剤1,500倍(前日/6回以内)を散布する。 ○雨が続く場合でも、散布間隔があかないように晴れ間を狙って防除する。 ○カメムシ類の発生がみられる園では、MRジョーカー水和剤2,000倍(14日前/2回以内)を散布する。(ハマキムシ類、キンモンホソガ、キンモンハマグリガ、シンクイムシ類同時防除)
		斑点落葉病、輪紋病、褐斑病、炭そ病、黒星病、すす点病、すす斑病、黒点病、うどんこ病、腐らん病	ナリアWDG 2,000倍 (50g)	前日	3回以内			
		シンクイムシ類、クワコナカイガラムシ、ハマキムシ類、ケムシ類、リンゴワタムシ	ダーズバンDF 3,000倍 (33g)	45日前	1回			

2022年度 JA山形おきたま りんご(ホルト-体系) 病害虫防除基準② りんご振興部会

月日	時期	対象病害虫	薬剤名及び濃度(水100%当り薬量)	収穫前使用回数	総使用回数	散布量(10a)	葉面散布肥料資材	注意事項	
9 /	6月下旬	黒星病 (2 次 感 染)	固着性展着剤	アピオン-E 1,000倍 (100cc)	—	—	600% %	果面保護 ハイカルティ または リフレッシュ 1,000倍	○十分攪拌後散布する。
			斑点落葉病、輪紋病、すす点病、すす斑病、炭そ病、褐斑病、黒点病、黒星病	オキシラン水和剤 500倍 (200g)	14日前	4回以内			
			アブラムシ類、キンモンホソガ、ギンモンハモグリガ、シンクイムシ類、カメムシ類、コナカイガラムシ類	スタークル顆粒水溶剤 2,000倍 (50g)	前日	3回以内			
10 /	7月上旬	黒星病 (2 次 感 染)	固着性展着剤	アピオン-E 1,000倍 (100cc)	—	—	600% %	果面保護 ハイカルティ または リフレッシュ 1,000倍	
			斑点落葉病、輪紋病、褐斑病、黒星病、すす点病・すす斑病	オーソサイド水和剤80 600倍 (166g)	前日	6回以内			
11 /	7月中旬	斑点落葉病 ・ 輪 紋 病 重 点 防 除	固着性展着剤	アピオン-E 1,000倍 (100cc)	—	—	600% %	果面保護 ハイカルティ または リフレッシュ 1,000倍	○ハダニの発生が多くなるので、散布むらが出ないように注意(ナミハダニ防除の効果を高めるため、防除の2~3日前に草刈りを行う)。 【褐斑病防除】 褐斑病は気温が20~25℃、多湿多雨条件下で発生しやすい。発生が懸念される場合は7月中旬~7月下旬の防除に「バード1570707L2,000倍(前日/2回以内)」を散布する。
			斑点落葉病、輪紋病、すす点病、すす斑病、褐斑病、黒点病、黒星病、炭そ病	オキシンドー水和剤80 1,200倍 (83g)	14日前	4回以内			
			アブラムシ類、カメムシ類、キンモンホソガ、クワコナカイガラムシ類、シンクイムシ類、ハマキムシ類	サイアノックス水和剤 1,000倍 (100g)	14日前	1回			
			リンゴハダニ、ナミハダニ、リンゴサビダニ	ダニゲッターフロアブル 2,000倍 (50cc)	前日	1回			
12 /	7月下旬	輪 紋 病 重 点 防 除	固着性展着剤	アピオン-E 1,000倍 (100cc)	—	—	600% %	果面保護 ハイカルティ または リフレッシュ 1,000倍	○早生種の収穫前日数に注意し散布する。
			斑点落葉病、輪紋病、すす点病、すす斑病、褐斑病、炭そ病、黒点病、黒星病	オキシラン水和剤 500倍 (200g)	14日前	4回以内			
			褐斑病、黒星病、黒点病、うどんこ病	トップジンM水和剤 2,000倍 (50g)	前日	6回以内			
			シンクイムシ類、キンモンホソガ、アブラムシ類、ハダニ類、カメムシ類	アーデントフロアブル 2,000倍 (50cc)	前日	3回以内			
13 /	8 上 中 旬		展着剤	ハイテンパワー 10,000倍 (10cc)	—	—	600% %		○ダイパワー、ペフラン、ベルクトは同一成分(イミダジリジン)を含み、使用回数は6回以内(ただし、開花期以降散布は3回以内)とする。
			斑点落葉病、黒星病、炭疽病、褐斑病、黒点病、輪紋病、すす点病、すす斑病	ダイパワー水和剤 1,000倍 (100g)	前日	3回以内			
			アブラムシ類、キンモンホソガ、ギンモンハモグリガ、シンクイムシ類、カメムシ類、コナカイガラムシ類	スタークル顆粒水溶剤 2,000倍 (50g)	前日	3回以内			
			ハダニ類、リンゴサビダニ、キンモンホソガ	コロマイト乳剤 1,000倍 (100cc)	前日	1回			
14 /	8月下旬		展着剤	ハイテンパワー 10,000倍 (10cc)	—	—	600% %		○ハダニ類の発生が見られる場合はコテツフロアブル2,000倍(前日/2回以内)を加用するか、アカリッチ乳剤2,000倍(前日/—)を単用散布する。また、アカリッチ乳剤は殺卵効果がないため、1週間間隔で2~3回、葉に十分付着するよう丁寧に散布し、展着剤は使用せず単用散布する。
			斑点落葉病、輪紋病、褐斑病、黒星病、すす点病・すす斑病	オーソサイド水和剤80 600倍 (166g)	前日	6回以内			
			ハマキムシ類、キンモンホソガ、ギンモンハモグリガ、シンクイムシ類、ケムシ類、ヨモギエダシヤク、ヒメボクトウ	エクシレルSE 5,000倍 (20cc)	前日	3回以内			
15 /	晩生種 9月中旬 早生種 収穫後		展着剤	ハイテンパワー 10,000倍 (10cc)	—	—	600% %		○ストライド顆粒水和剤は、散布後に高温が続くと予想される場合には使用しない。 ○キンモンホソガの多い園地では、スカウトフロアブル 2,000倍(前日/5回以内)を散布する。 ○晩生種のみ:9月中旬以降、天候不順が続く場合はストロイドフロアブル3,000倍(前日/3回以内)を散布する。
			斑点落葉病、すす点病、すす斑病、褐斑病、炭そ病、黒星病、黒点病	ストライド顆粒水和剤 1,500倍 (66g)	開花~ 収穫前日	3回以内			
16 /	10/中下旬頃		展着剤	ハイテンパワー 10,000倍 (10cc)	—	—	500% %		○今回の防除を実施できなかった場合は、収穫後に実施する。 ○ペフラン液剤25の開花期以降の総使用回数は3回以内とする。また、ペフラン液剤25、ベルクト、ダイパワーは同一成分(イミダジリジン)を含むため、開花期以降は合計で3回以内の使用にとどめる。 ○野鼠対策として根雪前にフジワン粒剤1樹当たり200gを、樹冠下半径50cmの範囲の土壌と均一に混和する。(使用回数2回以内) 【黒星病越冬伝染源対策】被害落葉は翌年の一次伝染源になるため、以下の方法で菌密度低下を図る。 (1)被害落葉を収集し、適切に処分する。(ブロー等を利用すると効率的に収集することができる。) (2)落葉後から展葉期にかけて、園内の土壌表面に堆肥(1~2t/10a)を散布し(堆肥マルチ)、被害落葉を被覆する。
			黒星病、褐斑病	ペフラン液剤25 1,500倍 (66cc)	前日	3回以内			

この防除基準は、令和3年11月24日現在の適用内容により作成しています。

2022年度 JA山形おきたま りんご(ホルド-体系) 病虫害防除基準①

りんご振興部会

月日	時期	対象病害虫	薬剤名及び濃度(水100%当り薬量)	収穫前使用回数	総使用回数	散布量(10a)	葉面散布肥料資材	注意事項	
① /	発芽直前	—	水 (88%)	※水88ℓにハーベストオイル2ℓ+石灰硫黄合剤10ℓを希釈する。(合計100ℓ)	—	—	—	○薬剤散布前に粗皮削りを行い、枝幹部に十分薬液がかかるよう丁寧に散布する。 ○リンゴハダニおよびナシマルカイガラムシの越冬密度が高い園地では、マシン油乳剤を必ず散布する。 ○消雪の遅い地帯では、発芽期から展葉期にハーベストオイル200倍(発芽後3週間まで)とベフラン液剤25,000倍(展葉期/6回以内※但し、開花期以降散布は3回以内)、タイアジン水和剤34,000倍(30日前/4回以内)混用して散布する。	
		ハダニ類、カイガラムシ類	ハーベストオイル 50倍 (2%)	発芽前	—	300%	—		
	腐らん病必須防除	越冬病害虫、腐らん病、カイガラムシ類、ハダニ類	石灰硫黄合剤 10倍 (10%)	発芽前	—				
② /	展葉初期(4月中旬) [花そう葉が2~3枚展葉した頃]	黒星病	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍 (10cc)	—	—	400%	○訪花昆虫を保護するため、活動時間前(早朝)に散布を行う。 ○黒星病の発生が多い場合は、トレノックスフロアブルに代えてICホルド-412 30倍(-/-)を散布する。ただし、ハーベストオイル等マシン油乳剤の散布後は、2~3日以上経過してからICホルド-412を散布する(マシン油乳剤の効果低下の防止)。	
		黒星病、黒点病、褐斑病、すす点病、すす斑病、炭そ病、輪紋病	トレノックスフロアブル 500倍 (200cc)	30日前	5回以内				
		アブラムシ類、シンクイムシ類、カイガラムシ類、キンモンホソガ、ギンモンハモグリガ	モスピラン顆粒水溶剤 4,000倍 (25g)	前日	3回				
③ /	展葉10日後	黒星病	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍 (10cc)	—	—	400%	○前年、黒星病の発生が多かった園地では、間隔があかないよう展葉10日後の防除を必ず実施する。 ○黒星病の発生が多い場合は、ストライド顆粒水和剤に代えてICホルド-412 30倍(-/-)を散布する。 【カイガラムシ防除】 前年にナシマルカイガラムシが多発した園地では、アブロードフロアブル1,000倍(30日前/2回以内)を加用する。枝幹部に十分かかるよう丁寧に散布する。	
		黒星病、モニリア病	ストライド顆粒水和剤 1,500倍 (66g)	開花前まで	2回以内				
④ /	開花直前(4月下旬)	黒星病	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍 (10cc)	—	—	400%	○訪花昆虫を保護するため、活動時間前(早朝)に散布を行う。 ○モニリア病対策として、発病した葉や花、花そうは摘み取り、適切に処分する。 ○ユニックス顆粒水和剤47は、耐性菌発生が心配されるため、この回の1回のみ散布とする。	
		黒星病、斑点落葉病、うどんこ病、モニリア病	ユニックス顆粒水和剤47 1,000倍 (100g)	14日前	4回以内				
		黒星病、赤星病、褐斑病、斑点落葉病、黒点病、炭そ病	ペンコゼブ水和剤 600倍 (166g)	30日前	3回以内				
		ハマキムシ類、ケムシ類	フェニックスフロアブル 5,000倍 (20cc)	前日	2回以内				
⑤ /	落花直後 中心花が7~8割落花 (5月上中旬)	黒星病、赤星病、モニリア病、うどんこ病、褐斑病、斑点落葉病、黒点病、すす点病、すす斑病	アスパイア水和剤 500倍 (200g)	30日前	3回以内	500%	果面保護ハイカルティまたはリフレッシュ1,000倍	○ウララDFは訪花昆虫に対する影響が少ない。 ○近年、リンゴワタムシの発生が増加傾向なので、散布ムラがないよう、樹幹全体に満遍なく散布する。 ○黒星病が多い園地では、落花10日後にアントラコール顆粒水和剤500倍(45日前/4回以内)を追加散布する。	
		アブラムシ類、リンゴワタムシ	ウララDF 2,000倍 (50g)	14日前	2回以内				
⑥ /	5月中下旬	黒星病	斑点落葉病、黒星病、黒点病、褐斑病、すす点病、すす斑病、炭そ病、輪紋病	トレノックスフロアブル 500倍 (200cc)	30日前	5回以内	600%	果面保護ハイカルティまたはリフレッシュ1,000倍	○ギンモンハモグリカにも効果がある。 ○ハマキムシ類、シンクイムシ類対策として、コンフューザ-Rを10a当たり100本設置する。
		カメムシ類、シンクイムシ類、リンゴワタムシ	バリアード顆粒水和剤 2,000倍 (50g)	前日	3回以内				
⑦ /	6月上旬	黒星病(二次感染)	斑点落葉病、黒点病、褐斑病、黒星病、輪紋病、炭そ病	アントラコール顆粒水和剤 500倍 (200g)	45日前	4回以内	600%	果面保護ハイカルティまたはリフレッシュ1,000倍	○余分な徒長枝は、防除の妨げになるので整理する。 ○黒星病対策として、発病した葉や果実は、見つけしだい摘み取り、適切に処分する。 【ヒメノミドリ防除】 園内をよく観察し、被害の兆候(樹幹からのフラス(虫糞と木屑の混ざったもの)の排出の有無)の早期発見に努め、被害を発見した場合は、フラスを取り除きロシフット(前日/5回以内)のノズルを排出孔に差し込み薬液がでるまで噴射する。
		シンクイムシ類、アブラムシ類、キンモンホソガ、ハマキムシ類	アディオン水和剤 2,000倍 (50g)	14日前	2回以内				
		ハダニ類	ダニコングフロアブル 2,000倍 (50cc)	前日	1回				
⑧ /	6月中旬	腐らん病	固着性展着剤	アビオン-E 1,000倍 (100cc)	—	—	600%	果面保護ハイカルティまたはリフレッシュ1,000倍	○腐らん病の発生が見られる園では、摘果痕からの感染防止のため、トップジンM水和剤1,500倍(前日/6回以内)を散布する。 ○雨が続く場合でも、防除間隔があかないように晴れ間を狙って防除する。 ○カメムシ類の発生がみられる園では、MRジョーカー水和剤2,000倍(14日前/2回以内)を散布する。(ハマキムシ類、キンモンホソガ、ギンモンハモグリカ、シンクイムシ類同時防除)
		黒星病、黒点病、炭そ病、輪紋病、褐斑病、すす点病、すす斑病、うどんこ病、腐らん病	ナリアWDG 2,000倍 (50g)	前日	3回以内				
		シンクイムシ類、クワコナカイガラムシ、ハマキムシ類、ケムシ類、リンゴワタムシ	ダーズバンDF 3,000倍 (33g)	45日前	1回				

2022年度 JA山形おきたま りんご(ホルド-体系) 病虫害防除基準②

りんご振興部会

月日	時期	対象病虫害	薬剤名及び濃度(水100%当り薬量)	収穫前使用日	総使用回数	散布量(10a)	葉面散布肥料資材	注意事項	
⑨ /	6月下旬	黒星病(2次感染)・斑点落葉病・輪紋病重点防除	斑点落葉病、輪紋病、褐斑病、炭そ病、黒星病	ICボルドー412	30倍 (3.3kg)	—	—	600 リットル	○コロマイト乳剤は使用直前に混用する。 ○ナミダニ防除の効果が高めるため、防除の2~3日前に草刈りを行う。
			アブラムシ類、キンモンホソガ、ギンモンハモグリガ、シンクイムシ類、カメムシ類、コナカイガラムシ類	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍 (50g)	前日	3回以内		
			ハダニ類、リンゴサビダニ、キンモンホソガ	コロマイト乳剤	1,000倍 (100cc)	前日	1回		
⑩ /	7月中旬	黒星病(2次感染)・斑点落葉病・輪紋病重点防除	斑点落葉病、輪紋病、褐斑病、炭そ病、黒星病	ICボルドー412	30倍 (3.3kg)	—	—	600 リットル	○カラムシ類に対する効果も期待される。
			モモシンクイガ、キンモンホソガ、ギンモンハモグリガ、ハマキムシ類、アブラムシ類、リンゴハダニ、ナミハダニ	テルスター水和剤	1,000倍 (100g)	前日	1回		
⑪ /	8月上旬 (8月5日頃)	黒星病(2次感染)・斑点落葉病・輪紋病重点防除	展着剤	ハイテンパワー	10,000倍 (10cc)	—	—	600 リットル	○早生種の収穫期が近いので、収穫前日数を守る。 ○ハダニ防除を徹底する。
			斑点落葉病、輪紋病、すす斑病、すす点病、褐斑病、黒点病、黒星病、炭そ病	オキシラン水和剤	600倍 (166g)	14日前	4回以内		
			アブラムシ類、キンモンホソガ、ギンモンハモグリガ、シンクイムシ類、カメムシ類、コナカイガラムシ類	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍 (50g)	前日	3回以内		
			ナミハダニ・リンゴハダニ	カネマイトフロアブル	1,000倍 (100cc)	7日前	1回		
⑫ /	8月中下旬	黒星病(2次感染)・斑点落葉病・輪紋病重点防除	展着剤	ハイテンパワー	10,000倍 (10cc)	—	—	600 リットル	○ハダニ類の発生が見られる場合は、ダニゲッターフロアブル2,000倍(前日/1回)を単用散布する。
			斑点落葉病、輪紋病、褐斑病、黒星病、すす点病・すす斑病	オーソサイド水和剤80	600倍 (166g)	前日	6回以内		
			ハマキムシ類、キンモンホソガ、ギンモンハモグリガ、シンクイムシ類、ケムシ類、ヨモギエダシヤク、ヒメボクトウ	エクシレルSE	5,000倍 (20cc)	前日	3回以内		
⑬ /	晩生種 9月中旬 早生種収穫後	黒星病(2次感染)・斑点落葉病・輪紋病重点防除	展着剤	ハイテンパワー	10,000倍 (10cc)	—	—	600 リットル	○ストライド顆粒水和剤は、散布後に高温が続くと予想される場合には使用しない。 ○キンモンホソガの多い圃地では、スカウトフロアブル2,000倍(前日/5回以内)を散布する。 ○晩生種のみ: 9月中旬以降、天候不順が続く場合はストロートライフロアブル3,000倍(前日/3回以内)を散布する。
			斑点落葉病、すす点病、すす斑病、褐斑病、炭そ病、黒星病、黒点病	ストライド顆粒水和剤	1,500倍 (66g)	開花~ 収穫前日	3回以内		
⑭ /	10/中下旬頃	黒星病(2次感染)・斑点落葉病・輪紋病重点防除	展着剤	ハイテンパワー	10,000倍 (10cc)	—	—	500 リットル	○今回の防除を実施できなかった場合は、収穫後に実施する。 ○ペフラン液剤25の開花期以降の総使用回数は3回以内とする。また、ペフラン液剤25、ベルコート、ダイバワは同一成分(イミダクタン)を含むため、開花期以降は合計で3回以内の使用にとどめる。 ○野鼠対策として根首前にフジワシ粒剤1樹当たり200gを、樹冠下半径50cmの範囲の土壌と均一に混和する。(使用回数2回以内) 【黒星病越冬伝染源対策】 被害落葉は翌年の一次伝染源になるため、以下の方法で菌密度低下を図る。 (1)被害落葉を収集し、適切に処分する。(プロア-等を利用すると効率的に収集することができる。) (2)落葉後から展葉期にかけて、圃内の土壌表面に堆肥(1~2t/10a)を散布し(堆肥マルチ)、被害落葉を被覆する。
			黒星病、褐斑病	ペフラン液剤25	1,500倍 (66cc)	前日	3回以内		

この防除基準は、令和3年11月24日現在の適用内容により作成しています。

2022年度 JA山形おきたま 西洋梨 (ハポルド-体系) 病害虫防除基準①

西洋なし振興部会

月日	時期	対象病害虫	薬剤名及び濃度(水100ℓ当り薬量)	収穫前使用日	総使用回数	散布量(10a)	一般資材	注意事項
① /	発芽直前	—	水 (88ℓ)	※水88ℓにハーベストオイル2ℓ+石灰硫黄合剤10ℓを希釈する。(合計100ℓ)	—	300ℓ	—	○粗皮削りをしっかり行い、休眠期防除を実施する。 ○リンゴハダニの越冬密度が高い園地では、マシン油乳剤を必ず散布する。 ○ハーベストオイルの希釈液に石灰硫黄合剤を10倍になるよう混用する。
		ハダニ類、カイガラムシ類	ハーベストオイル 50倍(2ℓ)	発芽前	—			
		越冬病害虫、ハダニ類	●石灰硫黄合剤 10倍(10ℓ)	発芽前	—			
② /	開花前	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	—	—	300ℓ	—	○訪花昆虫を保護するため、活動時間前(早朝)に散布を行う。 ○アブラムシ類の発生が早い園地では、モスピラン顆粒水溶剤2,000倍(前日/3回以内)を散布する。 ○例年ナシジノメイガの被害が多い園地では、対策として4月20日までにナシバコ100本/10aを設置する。モモンカイガやハマキムシ類の被害も多い場合は、5月下旬にコクローサーN200本/10aを設置する。(直射日光が当たる場所や、高温になりやすい金属支柱等への設置は避ける。)
		ハマキムシ類	フェニックスフロアブル 5,000倍(20cc)	前日	2回以内			
③ /	満開10日後	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	—	—	450ℓ	果面保護リフレッシュまたはバイカルティ1,000倍	○黒斑細菌病の発生がみられる園地では、ベンレート水和剤に代えてオキシン水和剤500倍(3日前/9回以内)を散布する。 ○胴枯病による枯死花そう、枯死枝は徹底して取り除き適切に処分する。
		赤星病、黒星病	オンリーワンフロアブル 4,000倍(25cc)	前日	3回以内			
		胴枯病、輪紋病、黒星病	★ベンレート水和剤 2,000倍(50g)	前日	4回以内			
④ /	5月下旬	胴枯病、輪紋病、黒星病	★ベンレート水和剤 2,000倍(50g)	前日	4回以内	450ℓ	果面保護リフレッシュまたはバイカルティ1,000倍	○黒斑細菌病の発生がみられる園地では、ベンレート水和剤に代えてテラフロアブル1,000倍(60日前/4回以内)を散布する。 ○この回及び次回防除には、サビ軽減のため展着剤を使用しない。 ○胴枯病による枯死花そう、枯死枝は徹底して取り除き適切に処分する。 ○ナシハダニ対策として、5月下旬以降、園地の草刈を徹底する。
		アブラムシ類、シンクイムシ類、カメムシ類、ケムシ類、コナカイガラムシ類、チュウゴクナシキジラミ	スタークル顆粒水溶剤 2,000倍(50g)	前日	3回以内			
【6月上旬～8月上旬】は輪紋病重点防除期間 降雨が続く場合は追加散布実施								
⑤ /	6月上旬	輪紋病、黒斑病、黒星病	●オキシンドー水和剤80 1,200倍(83g)	3日前	9回以内	600ℓ	果面保護リフレッシュまたはバイカルティ1,000倍	○殺菌剤は、確実に散布する。 ○ナシジノメイガの被害枝(芯折れ)は、見つけしだいせん除し、適切に処分する。 【胴枯病の時期別の防除対策】 《1～4月》剪定時の発病枝のせん除 ①3～5年枝の病斑は、削り取って★トップジンM [®] ースト(3回以内)か●パッチレート(3回以内)を塗布する。病斑が大きく、治療困難な発病枝はせん除する。 ②剪定後の切り口には必ず★トップジンM [®] ースト(3回以内)か●パッチレート(3回以内)を塗布する。 ③休眠期防除(石灰硫黄合剤)の実施 《5～7月 最重要》 ①枯死した枝や果(花)叢のせん除や、病斑の削り取りを実施し、塗布剤を処理する。病斑やせん除した枝等は適切に処分する。 ②トップジンM水和剤、ベンレート水和剤、有機銅剤などを間隔をあけずに定期的に散布する。 《8月～秋冬期》 ①発病程度の高い枝をせん除し、必ず塗布剤を処理する。 ②2～3年枝上の小黒点病斑を確認し、苗木や幼木であれば病斑を削り取り塗布剤を処理する。
		アブラムシ類、シンクイムシ類	スカウトフロアブル 2,000倍(50cc)	前日	5回以内			
		ハダニ類	ダニコングフロアブル 2,000倍(50cc)	前日	1回			
⑥ /	6月中旬	固着性展着剤	アピオン-E 1,000倍(100cc)	—	—	600ℓ	果面保護リフレッシュまたはバイカルティ1,000倍	○カラムシ注意 ○今後ハダニの発生が多くなるので、時期が遅れないよう散布する。(防除2～3日前に必ず草刈りを行なう)
		輪紋病、炭そ病、うどんこ病、黒斑病	ナリアWDG 2,000倍(50g)	前日	3回以内			
⑦ /	6月下旬	シンクイムシ類、ハマキムシ類、クワコナカイガラムシ	ダーズバンドF 3,000倍(33g)	30日前	3回以内	600ℓ	果面保護リフレッシュまたはバイカルティ1,000倍	
		固着性展着剤	アピオン-E 1,000倍(100cc)	—	—			
⑧ /	7月上旬	黒星病、輪紋病	●キャブレート水和剤 600倍(166g)	7日前	4回以内	600ℓ	果面保護リフレッシュまたはバイカルティ1,000倍	
		アブラムシ類、シンクイムシ類、ハマキムシ類、カメムシ類、ハダニ類	テルスター水和剤 1,000倍(100g)	前日	2回以内			
		固着性展着剤	アピオン-E 1,000倍(100cc)	—	—			
⑧ /	7月上旬	黒星病、輪紋病、うどんこ病、心腐れ症(胴枯病菌)	●スクレアフロアブル 2,000倍(50cc)	前日	3回以内	600ℓ	果面保護リフレッシュまたはバイカルティ1,000倍	
		ハダニ類、ニセナシバダニ	ダニゲッターフロアブル 2,000倍(50cc)	前日	1回			

2022年度 JA山形おきたま 西洋梨 (ハポルド[®]-体系) 病虫害防除基準②

西洋なし振興部会

月日	時期	対象病虫害	薬剤名及び濃度(水100%当り薬量)	収穫前使用日	総使用回数	散布量(10a)	一般資材	注意事項
⑨ /	7月 中旬	固着性展着剤	アビオン-E 1,000倍(100cc)	-	-	600 ^g / ^{ha}	果面保護 リフレッシュ または バイカルティ 1,000倍	【梅雨期の防除対策】 ・降雨が続く場合は、晴れ間を逃さず防除を実施する。 ・有機銅水和剤は散布後の積算降水量が100mmを越えると効果がなくなるため、次回の防除を前倒しで実施し、必要な場合は殺菌剤を追加散布する。 ・固着性展着剤アビオン-E1,000倍を必ず加用する。
		輪紋病	●オキシンドー水和剤80 1,200倍(83g)	3日前	9回以内			
		ハマキムシ類、アブラムシ類、シンクイムシ類、コナカイガラムシ類若齢幼虫	ダイアジノン水和剤34 1,000倍(100g)	14日前	6回以内			
⑩ /	7月 下旬	固着性展着剤	アビオン-E 1,000倍(100cc)	-	-	600 ^g / ^{ha}	果面保護 リフレッシュ または バイカルティ 1,000倍	カメムシ類対策 ○7月以降は、カメムシの発生が多くなるので、定期的に被害の出やすい園地の周辺部や樹上をよく観察する。 ○MRジョーカー水和剤2,000倍(14日前/2回以内)、ロイヤル水和剤1,000倍(前日/2回以内))を単用または、混用事例を確認し散布する。
		輪紋病、炭そ病、うどんこ病、黒斑病	ナリアWDG 2,000倍(50g)	前日	3回以内			
		アブラムシ類、シンクイムシ類、カメムシ類、ケムシ類、コナカイガラムシ類、チュウゴクナシキジラミ	スタークル顆粒水溶剤 2,000倍(50g)	前日	3回以内			
⑪ /	8月 月上旬	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	-	-	600 ^g / ^{ha}		○胴枯病にも効果がある。
		輪紋病、腐らん病	★トップジンM水和剤 1,000倍(100g)	前日	6回以内			
		アブラゼミ、シンクイムシ類、カメムシ類、アブラムシ類、ハマキムシ類	アグロスリン水和剤 1,000倍(100g)	前日	3回以内			
		ハダニ類	コロマイト水和剤 2,000倍(50g)	前日	1回			
⑫ /	8月 中旬	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	-	-	600 ^g / ^{ha}		○シンクイムシ類の発生が懸念される場合はエクシレルSE5,000倍(前日/3回以内)を加用する。
		輪紋病	●オキシンドー水和剤80 1,200倍(83g)	3日前	9回以内			
⑬ /	8月 下旬	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	-	-	600 ^g / ^{ha}		○ハダニ類の発生が見られる場合は、アカリッチ乳剤2,000倍(前日/一)を単用散布する。また、アカリッチ乳剤は殺卵効果がないため、1週間間隔で2~3回、葉に十分付着するよう丁寧に散布し、展着剤は使用せず単用散布する。
		輪紋病、腐らん病	★トップジンM水和剤 1,000倍(100g)	前日	6回以内			
		アブラムシ類、シンクイムシ類	スカウトフロアブル 2,000倍(50cc)	前日	5回以内			
⑭ /	晩生種 9月 月上旬	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	-	-	600 ^g / ^{ha}		
		輪紋病	●オキシンドー水和剤80 1,200倍(83g)	3日前	9回以内			
		シンクイムシ類	ノーモルト乳剤 1,000倍(100cc)	前日	2回以内			
⑮ /	9月 中旬	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	-	-	600 ^g / ^{ha}		○胴枯病の枯死枝等は、徹底して取り除き適正に処分する。 ○例年、ナンヒメシンクイの発生が多くなっている。発生が多い場合は、9月も間隔が空かないよう防除を実施する。とくに夜温が高いと発生が多くなるため、9月下旬に殺虫剤を追加散布する。
		輪紋病、腐らん病	★トップジンM水和剤 1,000倍(100g)	前日	6回以内			
		ハマキムシ類、シンクイムシ類	エクシレルSE 5,000倍(20cc)	前日	3回以内			
⑯ /	落葉後	固着性展着剤	アビオン-E 1,000倍(100cc)	-	-	300 ^g / ^{ha}		○胴枯病、腐らん病に対する効果も期待される。
		越冬病虫害	●石灰硫黄合剤 10倍(10 ^g / ^{ha})	発芽前	-			

この防除基準は、令和3年11月24日現在の適用内容により作成しています。

2022年度 JA山形おきたま 西洋梨（有袋ホルト[®]-体系）病害虫防除基準①

西洋なし振興部会

月日	時期	対象病害虫	薬剤名及び濃度(水100%当り薬量)	収穫前使用日	総使用回数	散布量(10a)	一般資材	注意事項	
① /	発芽直前	—	水 (88%)	※水88%にハーベストオイル2%+石灰硫黄合剤10%を希釈する。(合計100%)		300%	—	○粗皮削りをしっかり行い、休眠期防除を実施する。 ○リンゴハダニの越冬密度が高い園地では、マシン油乳剤を必ず散布する。 ○ハーベストオイルの希釈液に石灰硫黄合剤を10倍になるよう混用する。	
		ハダニ類、カイガラムシ類	ハーベストオイル 50倍(2%)	発芽前	—				
		越冬病害虫、ハダニ類	●石灰硫黄合剤 10倍(10%)	発芽前	—				
② /	開花前	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	—	—	300%	—	○訪花昆虫を保護するため、活動時間前(早朝)に散布を行う。 ○アブラムシ類の発生が早い園地では、モスピラン顆粒水溶液2,000倍(前日/3回以内)を散布する。 ○例年ナシメジクイの被害が多い園地では、対策として4月20日までにナシヒメコン100本/10aを設置する。モシクイガやハマキムシ類の被害も多い場合は、5月下旬にコンフューサーN200本/10aを設置する。(直射日光が当たるところや、高温になりやすい金属支柱等への設置は避ける。)	
		ハマキムシ類	フェニックスフロアブル 5,000倍(20cc)	前日	2回以内				
③ /	満開 10日後	【 胴枯病重点防除時期 】	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	—	—	450%	果面保護 リフレッシュ または バイカルティ 1,000倍	○黒斑細菌病の発生がみられる園地では、ベンレート水和剤に代えてオキシラン水和剤500倍(3日前/9回以内)を散布する。 ○胴枯病による枯死花そう、枯死枝は徹底して取り除き適切に処分する。
			赤星病、黒星病	オンリーワンフロアブル 4,000倍(25cc)	前日	3回以内			
			胴枯病、輪紋病、黒星病	★ベンレート水和剤 2,000倍(50g)	前日	4回以内			
④ /	5月 下旬	【 胴枯病重点防除時期 】	胴枯病、輪紋病、黒星病	★ベンレート水和剤 2,000倍(50g)	前日	4回以内	450%	果面保護 リフレッシュ または バイカルティ 1,000倍	○黒斑細菌病の発生がみられる園地では、ベンレート水和剤に代えてテラフロアブル1,000倍(60日前/4回以内)を散布する。 ○この回及び次回防除には、労軽減のため展着剤を使用しない。 ○ナシハダニ対策として、5月下旬以降、園地の草刈を徹底する。 ○胴枯病による枯死花そう、枯死枝は徹底して取り除き適切に処分する。
			アブラムシ類、シンクイムシ類、カメムシ類、ケムシ類、コナカイガラムシ類、チュウゴクナシキジラミ	スタークル顆粒水溶液 2,000倍(50g)	前日	3回以内			
【 6 月 上 旬 ~ 8 月 上 旬 】 は 輪 紋 病 重 点 防 除 期 間 降 雨 が 続 く 場 合 は 追 加 散 布 実 施									
⑤ /	6月 月上旬	【 胴枯病に★登録のある薬剤●効果が期待される薬剤 】	輪紋病、黒斑病、黒星病	●オキシドール水和剤80 1,200倍(83g)	3日前	9回以内	600%	果面保護 リフレッシュ または バイカルティ 1,000倍	○殺菌剤は、確実に散布する。 ○ナシメジクイの被害枝(芯折れ)は、見つけしだいせん除し、適切に処分する。
			アブラムシ類、シンクイムシ類	スカウトフロアブル 2,000倍(50cc)	前日	5回以内			
			ハダニ類	ダニコングフロアブル 2,000倍(50cc)	前日	1回			
⑥ /	6月 中旬	【 胴枯病の時期別の防除対策 】	固着性展着剤	アビオン-E 1,000倍(100cc)	—	—	600%	果面保護 リフレッシュ または バイカルティ 1,000倍	【 1~4月 】剪定時の発病枝のせん除 ①3~5年枝の病斑は、削り取って★トップジンMペースト(3回以内)か●パッレット(3回以内)を塗布する。病斑が大きく、治療困難な発病枝はせん除する。 ②剪定後の切り口には必ず★トップジンMペースト(3回以内)か●パッレット(3回以内)を塗布する。 ③休眠期防除(石灰硫黄合剤)の実施 【 5~7月 最重要 】 ①枯死した枝や果(花)叢のせん除や、病斑の削り取りを実施し、塗布剤を処理する。病斑やせん除した枝等は適切に処分する。 ②トップジンM水和剤、ベンレート水和剤、有機銅剤などを間隔をあけずに定期的に散布する。 【 8月~秋冬期 】 ①発病程度の高い枝をせん除し、必ず塗布剤を処理する。 ②2~3年枝上の小黒点病斑を確認し、苗木や幼木であれば病斑を削り取り塗布剤を処理する。
			輪紋病、炭そ病、うどんこ病、黒斑病	ナリアWDG 2,000倍(50g)	前日	3回以内			
			シンクイムシ類、ハマキムシ類、クワコナカイガラムシ	ダズバンDF 3,000倍(33g)	30日前	3回以内			
⑦ /	6月 下旬 袋かけ 終了	【 胴枯病の時期別の防除対策 】	固着性展着剤	アビオン-E 1,000倍(100cc)	—	—	600%	果面保護 リフレッシュ または バイカルティ 1,000倍	○カラムシ注意 ○輪紋病・胴枯病の果実への感染を防ぐため、6月下旬までに袋かけを行う。
			黒星病、輪紋病	●キャプレート水和剤 600倍(166g)	7日前	4回以内			
			アブラムシ類、シンクイムシ類、ハマキムシ類、カメムシ類、ハダニ類	テルスター水和剤 1,000倍(100g)	前日	2回以内			

2022年度 JA山形おきたま 西洋梨（有袋ホルト[®]-体系）病害虫防除基準②

西洋なし振興部会

月日	時期	対象病害虫	薬剤名及び濃度(水100%当り薬量)	収穫前使用日	総使用回数	散布量(10a)	一般資材	注意事項
⑧ / 7月 上旬	【 胴枯病重点 防除時期 】	固着性展着剤	アビオン-E 1,000倍(100cc)	—	—	600% %	果面保護 リフレッシュ または バイカルティ 1,000倍 ※袋かけを終了 した場合は使用し なくてもよい。	○降雨が多い場合は、オキシラン水和剤に代えてスクレアフロアブル2,000倍(前日/3回以内)を散布する。 ○今後ハダニの発生が多くなるので、時期が遅れないよう散布する。(防除2~3日前に必ず草刈りを行う)
		黒星病、黒斑細菌病、輪紋病、炭そ病、黒斑病	●オキシラン水和剤 500倍(200g)	3日前	9回以内			
		アブラムシ類、シンクイムシ類、カメムシ類、ケムシ類、コナカイガラムシ類、チュウゴクナシキジラミ	スタークル顆粒水溶剤 2,000倍(50g)	前日	3回以内			
		ハダニ類、ニセナシサビダニ	ダニゲッターフロアブル 2,000倍(50cc)	前日	1回			
⑨ / 7月 中旬	【 胴枯病重点 防除時期 】	輪紋病	●ICボルドー412 30倍(3.3kg)	—	—	600% %		カメムシ類対策 ○7月以降は、カメムシの発生が多くなるので、定期的に被害の出やすい園地の周辺部や樹上をよく観察する。 ○MR.ショーカー水和剤2,000倍(14日前/2回以内)、ローイ水和剤1,000倍(前日/2回以内)を単用または、混用事例を確認し散布する。 ○早生品種がある場合は、収穫前日数に注意して散布する。
		ハマキムシ類、シンクイムシ類、クワコナカイガラムシ	ダズバンDF 3,000倍(33g)	30日前	3回以内			
⑩ / 7月 下旬	【 胴枯病重点 防除時期 】	輪紋病	●ICボルドー412 30倍(3.3kg)	—	—	600% %		
		ハマキムシ類、アブラムシ類、シンクイムシ類、コナカイガラムシ類若齢幼虫	ダイアジノン水和剤34 1,000倍(100g)	14日前	6回以内			
⑪ / 8月 月上旬	【 胴枯病重点 防除時期 】	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	—	—	600% %		○胴枯病にも効果がある。
		輪紋病、腐らん病	★トップジンM水和剤 1,000倍(100g)	前日	6回以内			
		ハダニ類	コロマイト水和剤 2,000倍(50g)	前日	1回			
⑫ / 8月 月中下旬	【 胴枯病重点 防除時期 】	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	—	—	600% %		○早生種については、収穫前日数を厳守し散布する。 ○ハダニ類の発生が見られる場合は、アカリタッチ乳剤2,000倍(前日/—)を単用散布する。また、アカリタッチ乳剤は殺卵効果がないため、1週間間隔で2~3回、葉に十分付着するよう丁寧に散布し、展着剤は使用せず単用散布する。
		輪紋病	●オキシンドー水和剤80 1,200倍(83g)	3日前	9回以内			
		カメムシ類、アブラムシ類、シンクイムシ類、カイガラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤 2,000倍(50g)	前日	3回以内			
⑬ / 9月 月上旬	【 胴枯病重点 防除時期 】	輪紋病	●ICボルドー412 30倍(3.3kg)	—	—	600% %		○マルゲリット・マリラ・オーロ等の早生種の収穫が終了しない場合は、飛散しないように注意する。 ○胴枯病の枯死枝等は、徹底して取り除き適正に処分する。 ○例年、ナシバシクイの発生が多くなっている。発生が多い場合は、9月も間隔が空かないよう防除を実施する。とくに夜温が高いと発生が多くなるため、9月下旬に殺虫剤を追加散布する。
		ハマキムシ類、シンクイムシ類、ケムシ類	サムコルフロアブル10 5,000倍(20cc)	前日	3回以内			
⑭ / 落葉後	【 胴枯病重点 防除時期 】	固着性展着剤	アビオン-E 1,000倍(100cc)	—	—	300% %		○胴枯病、腐らん病に対する効果も期待される。
		越冬病害虫	●石灰硫黄合剤 10倍(10%)	発芽前	—			

この防除基準は、令和3年11月24日現在の適用内容により作成しています。

2022年度 JA山形おきたま西洋梨(コンフューザー体系)病虫害防除基準 ① 西洋なし振興部会

回数	時期	対象病虫害	成分回数	薬剤名及び濃度(水100%当り薬量)	収穫前使用回数	総使用回数	散布量	一般資材	備考		
1	落葉後 ～ 発芽前	固着性展着剤	-	アピオン-E	1,000倍	(100cc)	-	300%	○胴枯病が多いので、十分量を散布する。 ○剪定切り口及び傷口の癒合促進に塗布剤を用いる。 ★原液どうしでの混用は沈殿するので、ペフラン液の希釈液を作り、かき混ぜながら、石灰硫黄合剤を加える。 ○散布が遅れたり、重複散布すると薬害の原因になるので、必ず発芽前に散布する。 ○粗皮下等での越冬ダニの密度が非常に高いので、粗皮削りを徹底し、薬液をタツリかける。 ★ハーベストオイルを最初に作ってからペフラン液を作る。		
		黒星病	1	ペフラン液剤25	1,000倍	(100cc)	収穫後 ～ 休眠期			1回	
		越冬病虫害・ハダニ類	-	石灰硫黄合剤	10倍	(10%)	発芽前			-	
		または									
		ハダニ類・カイガラムシ類	1	ハーベストオイル	50倍	(2%)	発芽前			-	
		黒星病	2	ペフラン液剤25	1,000倍	(100cc)	収穫後 ～ 休眠期	1回			
2	開花直前	展着剤	-	マイリノー	10,000倍	(10cc)	-	350%	○春肥料(必要に応じ) ○アブラムシの発生が懸念される場合はモスピラン顆粒水溶性2,000倍(前日/3回以内)を散布する。また、この薬剤はナンキジラミへの効果も期待できる。(散布の際は訪花昆虫には細心の注意を払う) ○胴枯病発病枝等は、徹底し取り除き焼却する。		
		赤星病・うどんこ病・黒星病	3	トリフミン水和剤	2,000倍	(50g)	前日			3回	
		ハマキムシ類	4	フェニックスフロアブル	4,000倍	(25cc)	前日			2回	
	～4/20まで	【交信かく乱剤】(性フェロモン剤) ナシヒメシンクイ	-	ナシヒメコン	使用時期→成虫発生初期から終期 使用方法→ディスプレイを対象作物の枝に巻きつけ設置する。		100本	●フェロモン剤については、ナシヒメコンまたはコンフューザーいづれかを使用する。 ナシヒメコンを使用する場合はコンフューザーより残効が期待されるため、越冬成虫等の対策として開花前の4月20日までに設置する。コンフューザーは残効が劣るので6月上旬頃に設置する。			
3	満開10日後	展着剤	-	マイリノー	10,000倍	(10cc)	-	350%	バイカルティ1000倍 または リフレッシュ1000倍	○訪花昆虫には十分注意する。 ○黒斑細菌病の発生がみられる園地では、ベンレート水和剤に代えてオキシラン水和剤500倍(3日前/9回以内)を散布する。 ○アブラムシ類の発生が早い園地は、ウララDF2,000倍(14日前/2回以内)またはモスピラン顆粒水溶性2,000倍(前日/3回以内)を加用散布する。	
		輪紋病・うどんこ病・胴枯病・黒星病	5	ベンレート水和剤	2,000倍	(50g)	前日				4回
		ハダニ類	6	バロックフロアブル	2,000倍	(50cc)	14日前				2回
4	5月下旬 (5/25頃)	輪紋病・うどんこ病・胴枯病	7	ベンレート水和剤	2,000倍	(50g)	前日	4回	450%	バイカルティ1000倍 または リフレッシュ1000倍	○黒斑細菌病の発生がみられる園地では、ベンレート水和剤に代えてオキシラン水和剤500倍(3日前/9回以内)を散布する。 ○山手などカメムシの被害が見られる園地では、ダントツ水溶性2,000倍(前日/3回以内)またはスタークル顆粒水溶性2,000倍(前日/3回以内)を散布する。 ○ハマキムシ類に対する効果が期待される。
		シンクイムシ類・アブラムシ類	8	スカウトフロアブル	2,000倍	(50cc)	前日	5回			
6月上旬		【交信かく乱剤】(性フェロモン剤)	-	コンフューザーN	【対象害虫】モモシンクイガ・ナシヒメシンクイ・チャハマキ・チャノコカクモンハマキ・リンゴコカクモンハマキ・リンゴモンハマキ		200本	200本	使用時期→成虫発生初期から終期 使用方法→ディスプレイを対象作物の枝に巻きつけ設置する。		
			-	コンフューザーR	【対象害虫】モモシンクイガ・ナシヒメシンクイ・リンゴコカクモンハマキ・ミダレカクモンハマキ・リンゴモンハマキ		100本			○防風ネットを設置し、園地の中心部より外側を多めに設置する。 ○傾斜地では、下方より上方部に多めに設置する。	
5	6月上旬	展着剤	-	マイリノー	10,000倍	(10cc)	-	薬液量厳守	バイカルティ1000倍 または リフレッシュ1000倍	○これ以降、新梢伸長期となり枝葉が茂ってくるので、薬液量を厳守する。	
		輪紋病・黒斑病・心腐れ症(胴枯病)・黒斑細菌病	9	デランフロアブル	1,000倍	(100cc)	60日前	4回			
6	6月中旬	固着性展着剤	-	アピオン-E	1,000倍	(100cc)	-	500%	バイカルティ1000倍 または リフレッシュ1000倍	固着性展着剤は確実に加用する。 ○梅雨期間の防除は、降雨の影響をうけ不定期となりやすいので、十分な薬量と丁寧な散布に心がける。 【梅雨期のポイント】 ・晴れ間を逃さず、雨前散布を徹底する。 ・固着性展着剤を加用する。 ・降雨が多い場合は殺菌剤を追加散布する。 (有機銅の場合は100mmの降雨で残効がなくなる。) ・薬液量をしっかりとかける。	
		輪紋病・炭そ病・黒斑病・うどんこ病	10	アミスター10フロアブル	1,000倍	(100cc)	前日				5回
		シンクイムシ類・カメムシ類・コナカイガラムシ類・アブラムシ類・ケムシ類・チュウゴクナンキジラミ	11	ダントツ水溶性	2,000倍	(50g)	前日				3回
		ハダニ類	12	ダニコングフロアブル	2,000倍	(50cc)	前日	1回			
7	6月下旬	固着性展着剤	-	アピオン-E	1,000倍	(100cc)	-	500%	バイカルティ1000倍 または リフレッシュ1000倍	○使用回数キャブタン9回以内、ベノミル6回以内(但し、塗布は2回以内、散布は4回以内)	
		輪紋病	13,14	キャプレート水和剤	600倍	(166g)	7日前				4回

2022年度 JA山形おきたま 西洋梨(コンフェーサー体系) 病虫害防除基準 ② 西洋なし振興部会

回数	時期	対象病虫害	成分回数	薬剤名及び濃度(水100%当り薬量)	収獲前使用日数	総使用回数	散布量10a	一般資材	備考	
8	7月初旬(7/5頃)	固着性展着剤	-	アビオン-E	1,000倍	(100cc)	-	-	500% バイカルティ1000倍 または リフレッシュ1000倍	○混用により凝集するため、しっかり攪拌する。 ○本欄の薬剤は収獲前使用日数が45日前となっているので、早生種の収獲を考慮して、遅れずに散布する。 ○7~8月は、カメムシ対策を徹底(飛来を確認したら防除) ○輪紋病防除のポイント時期(散布間隔を空けないこと)
		輪紋病・黒星病・黒斑病	15.16	ベフキン水中和剤	1,000倍	(100g)	45日前	4回		
		シンクイムシ類・ハマキムシ類・アブラムシ類・クワコナカイガラムシ	17	サイアノックス水中和剤	1,000倍	(100g)	無袋栽培 45日前	3回		
9	7月中旬(7/15頃)	固着性展着剤	-	アビオン-E	1,000倍	(100cc)	-	-	500% バイカルティ1000倍 または リフレッシュ1000倍	○ナリアWDGはルレクチェ、ピオーネの葉・果実および藤稜、サニールージュ、シャルドネの葉への薬害に注意 ○遅れないよう散布する。
		輪紋病・炭そ病・うどんこ病・黒斑病	18.19	ナリアWDG	2,000倍	(50g)	前日	3回		
		ハダニ類・ニセナシサビダニ	20	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	(50cc)	前日	1回		
10	7月下旬(7/25頃)	固着性展着剤	-	アビオン-E	1,000倍	(100cc)	-	-	600% バイカルティ1000倍 または リフレッシュ1000倍	④【シンクイムシ類対策】 世代を追って密度が増加することが考えられ、8月以降の防除は重要となる。とくに今後、気温が高く経過する場合は、殺虫剤の間隔があかないよう、備考欄の薬剤を加用散布する。
		輪紋病・黒星病・黒斑病	21.22	オキシラン水中和剤	600倍	(166g)	3日前	9回		
		シンクイムシ類・アブラムシ類・カメムシ類・ハマキムシ類・ハダニ類	23	テルスター水中和剤	1,000倍	(100g)	前日	2回		
11	8月上旬	展着剤	-	マイリノー	10,000倍	(10cc)	-	-	600% 薬液量厳守	★降雨が続く場合はオキシンドー水中和剤80に代えて、キャブレート水中和剤600倍(7日前/4回以内)もしくはナリアWDG2,000倍(前日/3回以内)を使用する。 ○早生種は収獲前使用日数を厳守 ○シンクイムシ類などの発生が見られる場合には、ダイアジノン水中和剤34 1,000倍(14日前/6回以内)を加用散布する。※早生品種の収獲前日数に注意。
		輪紋病	24	オキシンドー水中和剤80	1,200倍	(83g)	3日前	9回		
12	8月中旬	展着剤	-	マイリノー	10,000倍	(10cc)	-	-	600% 薬液量厳守	○オキシラン水中和剤は、りんごの登録が14日前となっているので、早生りんご植栽園と隣接する場合は注意して散布する。 ○ハダニの発生が遅くまで見られる園地では、8月中旬のコロマイト水中和剤を8月下旬に使用する。(注意:使用回数1回)
		輪紋病・黒星病・黒斑病	25.26	オキシラン水中和剤	600倍	(166g)	3日前	9回		
		シンクイムシ類・カメムシ類・コナカイガラムシ類・アブラムシ類・ケムシ類・チュウゴクナシキジラミ	27	ダントツ水溶剤	2,000倍	(50g)	前日	3回		
		ハダニ類	-	コロマイト水中和剤	2,000倍	(50g)	前日	1回		
13	8月下旬	展着剤	-	マイリノー	10,000倍	(10cc)	-	-	600% 薬液量厳守	○シンクイムシ類の発生が見られる場合はエクシレルSE5,000倍(前日/3回以内)を加用散布する。
		輪紋病・炭そ病・黒斑病・うどんこ病	28	ストロブードライフロアブル	2,000倍	(50g)	前日	3回		
14	9月上旬(晩生種対応)	展着剤	-	マイリノー	10,000倍	(10cc)	-	-	600% 薬液量厳守	④★秋雨前線が停滞し降雨が続く場合は、梅雨期同様に防除を徹底する。(特に高温多湿が続く様な場合には、防除を前倒しするか間に入れる。)
		輪紋病	29	オキシンドー水中和剤80	1,200倍	(83g)	3日前	9回		
		シンクイムシ類・アブラムシ類	30	スカウトフロアブル	2,000倍	(50cc)	前日	5回		
15	9月中旬(晩生種対応)	展着剤	-	マイリノー	10,000倍	(10cc)	-	-	600% 薬液量厳守	○ハダニ類の発生が見られる場合は、アカリタッチ乳剤2,000倍(前日/—)を単用散布する。また、アカリタッチ乳剤は殺卵効果がないため、1週間間隔で2~3回、葉に十分着するよう丁寧に散布し、展着剤は使用せず単用散布する。 ○夜温が高く経過する場合はナシヒメシンクイが発生しやすいため9月下旬頃にバリアード顆粒水中和剤2,000倍(前日/3回以内)を散布する。
		輪紋病・炭そ病・黒斑病・うどんこ病	31	アミスター10フロアブル	1,000倍	(100cc)	前日	5回		
16	特別散布	展着剤	-	マイリノー	10,000倍	(10cc)	-	-	600% 薬液量厳守	ラ・フランス専用肥料 有機100%の施用 収獲直後 7~8袋/10a 雪解け直後 2~3袋/10a
		輪紋病・腐らん病	32	トップジンM水中和剤	1,000倍	(100g)	前日	6回		
17	落葉後	固着性展着剤	-	アビオン-E	1,000倍	(100cc)	-	-	500% 薬液量厳守	
		越冬病虫害	-	石灰硫黄合剤	10倍	(10%)	発芽前			

この防除基準は、令和4年2月1日現在の適用内容により作成しています。

2022年度 JA山形おきたま もも 病害虫防除基準 ①

もも振興部会

月日	散布時期	対象病害虫	薬剤名及び濃度(水100%当り薬量)	収穫前使用日	総使用回数	散布量(10a)	一般資材・備考	注意事項
① /	発芽前 縮葉病必須防除 発芽するまでに必ず散布。	モモアカアブラムシ、カイガラムシ類	ハーベストオイル 50倍(2%)	発芽前	—	350g		<ul style="list-style-type: none"> ○出来るだけ暖かく風のない日を選んで、枝先から樹元まで丁寧に散布する。 ○剪定の切り口には、トップジンMヘーストまたはハツレト(3回以内)を原液で塗布する。 ○カイガラムシの被害が多い園地では、アロードフロアブル1,000倍(14日前/3回以内)を加用する。※ネクリソンの登録は7日前/2回以内なので注意する。 ○コウモリが対策として、周辺も含めた園地の清掃、除草を行いきれいにしておく。(特に幹周辺はきれいにしておく) ○カイガラムシ類の発生が多い樹では、休眠期に高圧水による洗い流しや、ワイヤーブラシがけを行なう。 ○前年落葉期にテビキ剤を行わなかった場合は、コスカハ対策として、ガットサイドS 1.5倍液(30日前/1回)を樹幹部および主枝に塗布する。(樹幹処理は1回であるため、落葉期のテビキ剤とガットサイドSの併用は不可)
		黒星病、灰星病、 せん孔細菌病 、縮葉病	トレノックスフロアブル 500倍(200cc)	7日前	5回以内			
② /	開花直前 (花弁の見え始めまで)	せん孔細菌病	ICボルドー412 30倍(3.3kg)	—	—	350g		<ul style="list-style-type: none"> ○せん孔細菌病の感染が始まる時期なので、前年発生の多かった園地は必ず散布する。 ○ICボルドーに替えて4-12式ボルドー液または、カスシボルドー500倍(開花前まで/3回以内)を散布してもよい。 ○前年の収穫終了後、せん孔細菌病の発生の多かった園地は、ICボルドー散布前にカスシボルドーを散布する。(カスシボルドーは2回使用しない)
③ /	落花直後 (5月上旬)	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	—	—	350g		<ul style="list-style-type: none"> せん孔細菌病 生育適温は、25℃前後で葉や果実の気孔や傷口から侵入する。風当たりの強い園や湿度の高い園では発生が多い。 対策と耕種防除 ①防風網を設置する。 ②伝染源となる春型病斑は4月下旬から7月上旬頃まで発生するので、園地を見回り早期発見に努める。 ③収穫後のボルドー液散布。(間隔を空けずに散布する)
		黒星病、灰星病、ホモブシス腐敗病	オーシャインフロアブル 2,000倍(50cc)	前日	3回以内			
		せん孔細菌病	ストマイ液剤20 1,000倍(100cc)	60日前	2回以内			
		ハマキムシ類、ケムシ類、シンクイムシ類、モモハモグリガ、コスカシバ	フェニックスフロアブル 4,000倍(25cc)	前日	2回以内			
④ /	5月中旬 (幼果期)	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	—	—	400g		<ul style="list-style-type: none"> ○モモハモグリガやシンクイムシ類等の対策として、5月中～下旬にコンフューサー-MM100～120本/10aを設置する。
		黒星病、灰星病、ホモブシス腐敗病、 せん孔細菌病	デランフロアブル 600倍(166cc)	7日前	4回以内			
		モモハモグリガ、シンクイムシ類、アブラムシ類、カメムシ類、アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤 2,000倍(50g)	前日	3回以内			
⑤ /	5月下旬	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	—	—	400g		<ul style="list-style-type: none"> ○カメムシ類の被害がみられる場合は、ダイアジノン水和剤に代えて、ミチオン水和剤40 1,000倍(3日前/6回以内)を加用する。 ○カイガラムシ類の発生が見られる場合は、モメントフロアブル2,000倍(7日前/3回以内)を単用散布する。
		黒星病、灰星病、ホモブシス腐敗病、うどんこ病、すすかび病、果実赤点病	ベルコート水和剤 1,500倍(66g)	前日	3回以内			
		せん孔細菌病	マイコシールド 1,500倍(66cc)	21日前	5回以内			
		アブラムシ類、ハマキムシ類、シンクイムシ類	ダイアジノン水和剤34 1,000倍(100g)	前日	4回以内			
⑥ /	6月上旬	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	—	—	400g		<ul style="list-style-type: none"> ○カメムシ類の発生には常に注意する。
		黒星病、灰星病、ホモブシス腐敗病、 せん孔細菌病	デランフロアブル 600倍(166cc)	7日前	4回以内			
		モモハモグリガ、シンクイムシ類、アブラムシ類	スカウトフロアブル 2,000倍(50cc)	前日	5回以内			
		ハダニ類	ダニコングフロアブル 2,000倍(50cc)	前日	1回			
⑦ /	6月中下旬	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	—	—	400g		<ul style="list-style-type: none"> ○シンクイムシ類やハマキムシ類の発生が多くなるので注意する。 ○せん孔細菌病の多発生が懸念される場合は、マイコシールド1,500倍(21日前/5回以内)を散布する。早生品種がある場合は収穫前日数に注意する。
		黒星病、灰星病、 せん孔細菌病	トレノックスフロアブル 500倍(200cc)	7日前	5回以内			
		シンクイムシ類、ハマキムシ類	ダーズバンDF 3,000倍(33g)	14日前	5回以内			

「せん孔細菌病対策」園地を見回り、春型病斑を発見次第切り取り、適切に処分する。

2022年度 JA山形おきたま もも 病害虫防除基準 ② もも振興部会

月日	散布時期	対象病害虫	薬剤名及び濃度(水100%当り薬量)	収穫前使用日	総使用回数	散布量(10a)	一般資材・備考	注意事項
⑧ /	7月上旬	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	—	—	400 ^g 粒		
		灰星病、黒星病、ホモブシス腐敗病、うどんこ病、炭そ病、果実赤点病、すすかび病	ナリアWDG 2,000倍(50g)	前日	2回以内			
		アブラムシ類、シンクイムシ類、ハマキムシ類、モモハモグリガ、カメムシ類	スミチオン水和剤40 1,000倍(100g)	3日前	6回以内			
⑨ /	7月中旬	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	—	—	400 ^g 粒		
		灰星病、うどんこ病、ホモブシス腐敗病、すすかび病、果実赤点病	ベルコート水和剤 1,500倍(66g)	前日	3回以内			
		モモハモグリガ、シンクイムシ類、アブラムシ類、カメムシ類、アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤 4,000倍(25g)	前日	3回以内			
		ハダニ類、モモサビダニ	ダニゲッターフロアブル 2,000倍(50cc)	前日	1回			
⑩ /	7月下旬	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	—	—	400 ^g 粒	カルシウム肥料 バイカルティ 1,000倍	○灰星病の被害果は見つけ次第取り除き土中に埋める。
		灰星病、黒星病、ホモブシス腐敗病、炭そ病	オンリーワンフロアブル2,000倍(50cc)	前日	3回以内			
		モモハモグリガ、シンクイムシ類、アブラムシ類	スカウトフロアブル 2,000倍(50cc)	前日	5回以内			
⑪ /	8月上旬 ～ 8月中旬	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	—	—	400 ^g 粒	カルシウム肥料 バイカルティ 1,000倍	○ウツロシカラムシがみられる園地では、バリアード顆粒水和剤に代えて、コテツフロアブル2,000倍(前日/2回以内)を散布する。※ネクターンの収穫前日数は7日前なので注意する。 ○この回の散布から収穫期まで、防除間隔が空いたり不順天候が続く場合、または、シンクイムシ類の発生が懸念される場合は、次回の薬剤を繰上げて散布する。
		灰星病、黒星病、ホモブシス腐敗病、うどんこ病、炭そ病、果実赤点病、すすかび病	ナリアWDG 2,000倍(50g)	前日	2回以内			
		アブラムシ類、シンクイムシ類、モモハモグリガ	バリアード顆粒水和剤 4,000倍(25g)	前日	3回以内			
⑫ /	晩生種 8月下旬 ～ 9月上旬	展着剤	ハイテンパワー 10,000倍(10cc)	—	—	400 ^g 粒		○この時期までに収穫が終了した園地では、インダーフロアブルに代えてデランフロアブル600倍(7日前/4回以内)を散布する。
		灰星病、黒星病	インダーフロアブル 5,000倍(20cc)	前日	4回以内			
		ハマキムシ類、ケムシ類、シンクイムシ類、モモハモグリガ	エクシレルSE 5,000倍(20cc)	前日	3回以内			
⑬ /	収穫直後 (9月中旬)	せん孔細菌病	ICボルドー412 30倍(3.3kg)	—	—	400 ^g 粒		○収穫終了後、できるだけ早く散布する。 ○収穫中または、収穫前の極晩生種には飛散しないよう注意する。
		固着性展着剤	アピオン-E 1,000倍(100cc)	—	—			
		ハマキムシ類、シンクイムシ類、アブラムシ類、モモハモグリガ	スミチオン水和剤40 1,000倍(100g)	3日前	6回以内			
⑭ /	前回散布 10日後 (9月下旬)	せん孔細菌病	ICボルドー412 30倍(3.3kg)	—	—	400 ^g 粒		○モモハモグリガの発生が多い場合は、ICボルドー412にフェニックスフロアブル4,000倍(前日、2回以内)を加用する。 ○ICボルドー412に代えてコサイド3000、2,000倍(収穫後～落葉まで/-)を散布しても良い。 ○せん孔細菌病多発園では10月中旬まで1回(もう一度ICボルドー412、30倍(-/-)またはコサイド3000、2,000倍(収穫後～落葉まで/-)を追加散布する。
		固着性展着剤	アピオン-E 1,000倍(100cc)	—	—			
⑮ /	落葉期 10月～ 11月中旬	展着剤	アプローチBI 1,000倍(100cc)	—	—	350 ^g 粒		○ラビキラー乳剤を散布する場合は、枝幹部に十分散布する。(降雨後に散布するとより浸透しやすい) ○縮葉病が多い園地では、12月中旬頃に石灰硫黄合剤10倍(発芽前/-)またはオキラン水和剤500倍(発芽前/4回以内)を散布する。 ○スミチオン水和剤40、ラビキラー乳剤、ガツサイドSIは、同一成分を含み、総使用回数6回以内(樹幹処理は1回)とする。 ユスカシバの圧殺 ○ユスカシバの虫糞が出ているところを 木づち等で軽くたたいて圧殺する。
		コスカシバ	ラビキラー乳剤 200倍(500cc)	落葉後～発芽前 (休眠期)	1回			

この防除基準は、令和3年11月24日現在の適用内容により作成しています。